


تأسيس توجيهي
2007

توزيع مجاناً
غير مخصصة للبيع



الأستاذ يزن العقرباوي

الرياضيات للأدبي والشرعي والريادة
 π



تابع دنص التأسيس مجاناً
على موقع وتد التعليمي

تأسيس توجيهي

2007

النجاح يعتمد عليك
لكننا نرغب بأن تكون أحد أدواته



المنصة الأولى في الشرق الأوسط
الحاصلة على شهادة الآيزو في التعليم

تواصل مع الأستاذ يزن العقرباوي

+ 972 598 918 200

ورقة عمل للتأسيس

جبل 2007

❖ الإشارات

ب) الضرب والقسمة

٢) متشابهات

سالب وسالب

أو

موجب وموجب

١) مختلفات

سالب وموجب

أو

موجب وسالب

الناتج
(موجب)

الناتج
(سالب)

:مثال

$$6 = 3 - \times 2 - (1)$$

$$8 = 1 - \times 8 - (2)$$

$$10 = 2 \times 5 (3)$$

$$5 = \frac{20}{4} (4)$$

$$3 = \frac{9}{3} (5)$$

:مثال

$$10 = 2 \times 5 - (1)$$

$$12 = 4 \times 3 - (2)$$

$$5 = 1 - \times 5 (3)$$

$$2 = \frac{4}{2} (4)$$

$$2 = \frac{8}{4} (5)$$

أ) الجمع والطرح

٢) متشابهات

سالب وسالب

أو

موجب وموجب

١) مختلفات

سالب وموجب

أو

موجب وسالب

نجمع ونفس
الإشارة

طرح وإشارة
الأكبر

:مثال

:مثال

$$0 = 2 - 3 - (1)$$

$$7 = 1 - 6 - (2)$$

$$7 = 2 + 5 (3)$$

$$6 = 2 - 4 - (4)$$

$$5 = 3 - - 2 (5)$$

$$3 = 1 + 4 - (1)$$

$$2 = 3 + 5 - (2)$$

$$3 = 8 - 5 (3)$$

$$5 = 7 + 2 - (4)$$

$$= 1 \times 3 - \times 5 - 2 + 3 - :مثال$$

$$1 \times 10 + 2 + 3 -$$

$$10 + 2 + 3 -$$

$$14 = 10 + 1 -$$



التكعيب

$$1 = \sqrt[3]{1}$$

$$8 = \sqrt[3]{8}$$

$$27 = \sqrt[3]{27}$$

$$64 = \sqrt[3]{64}$$

$$125 = \sqrt[3]{125}$$

$$216 = \sqrt[3]{216}$$

$$49 = \sqrt[3]{49}$$

$$64 = \sqrt[3]{64}$$

$$81 = \sqrt[3]{81}$$

$$100 = \sqrt[3]{100}$$

التربيع

$$1 = \sqrt{1}$$

$$4 = \sqrt{4}$$

$$9 = \sqrt{9}$$

$$16 = \sqrt{16}$$

$$25 = \sqrt{25}$$

$$36 = \sqrt{36}$$

$$49 = \sqrt{49}$$

$$64 = \sqrt{64}$$

$$81 = \sqrt{81}$$

$$100 = \sqrt{100}$$

الجذور

أ) الجذر التربيعي:

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{1} = 1$$

$$\sqrt{81} = 9$$

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{100} = 10$$

$$\sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{49} = 7$$



ب) الجذر التكعبي:

$$1 = \sqrt[3]{1}$$

$$2 = \sqrt[3]{8}$$

$$3 = \sqrt[3]{27}$$

$$4 = \sqrt[3]{64}$$

$$5 = \sqrt[3]{125}$$

$$6 = \sqrt[3]{216}$$

❖ تشکیله

* صفر \times أو \div عدد = صفر

مثال:

$$1) \text{ صفر} + 5 = 5$$

$$2) \text{ صفر} + 3 = 3$$

$$3) \text{ صفر} - 2 = 2$$

$$4) 7 - \text{صفر} = 7$$

$$5) 8 - \text{صفر} = 8$$

مثال:

$$1) \frac{\text{صفر}}{5} = \text{صفر}$$

$$2) \frac{\text{صفر}}{3} = \text{صفر}$$

$$3) \frac{\text{صفر}}{700} = \text{صفر}$$

$$4) \text{صفر} \times 2 = \text{صفر}$$

$$5) \text{صفر} \times 3 = \text{صفر}$$

$$6) 7 \times \text{صفر} = \text{صفر}$$



❖ صفر = (عدد)

:
الحل

$$1 = .(5) (1)$$

$$1 = .(7) (2)$$

$$1 = .(9) (3)$$

$$1 = .(8) (4)$$

$$1 = .(يزن) (5)$$

❖ جمع وطرح المتغيرات (قصص الأحرف)

شروطها:-

(1) تشابه الأحرف

(2) تشابه الأسس

الحل تجمع أو تطرح المعاملات وبنزل الحرف

:
الحل

$$(1) س^5 + س^3 = س^8$$

$$(2) س^8 + س^3 - س^2 = س^10$$

$$(3) س^7 - س^5 = س^2$$

$$(4) س^3 + س^2 - س^5 = س^4$$

$$\boxed{+} = س^4 - س^5 \quad \text{الحل}$$

$$(5) س^6 - س^2 + س^8 = س^3$$

$$\boxed{+} = س^3 + س^8 \quad \text{الحل}$$

$$(6) س^3 + س^2 - س^4 = س^7$$

$$\boxed{+} = س^4 + س^3 \quad \text{الحل}$$



❖ ضرب وقسمة المتغيرات

* شرط: تشابه الأحرف (الله لا يرد الأسس)

الحل عند الضرب تضرب المعادلات وتجمع الأسس

مثال:

$$(1) \ 1s^0 \times s^3 = s^3$$

$$(2) \ 2s^2 \times s^3 = s^5$$

$$(3) \ s^4 \times s^2 = s^6$$

$$(4) \ s^5 \times s^0 = s^5$$

$$(5) \ 2s \times 1s^6 = s^7$$

$$(6) \ 1s^2 \times s^3 = s^5$$

$$(7) \ s^2(5s^4 - 4s^3) = s^6$$

❖ عند القسمة تقسم المعاملات وتطرح الأسس

مثال:

$$(1) \ \frac{s^8}{s^2} = s^6$$

$$(2) \ \frac{s^4}{s^2} = s^2$$

$$(3) \ \frac{s^7}{s^4} = s^3$$



$$\frac{s}{2} = \frac{s^0}{4^2} (4)$$

$$2 = \frac{s^2}{2^2} (5)$$

❖ خلطة

$$(1) s^2 \times 5s + 3s^3$$

الحل

$$[3s^8] = 3s^3 + 3s^5$$

$$(2) 4s^2 + s^5 \times 4s$$

الحل

$$[4s^24] = 4s^2 + 20s^4$$

$$s^5 - \frac{4s^3}{5s^5} (3)$$

الحل

$$[s^3 - 4s^3] = s^3 - 4s^6$$

$$(4) s^6 - 2 \times 4s^3$$

الحل

$$[6s - 8s^3]$$



❖ التحليل

١) فرق بين مربعين

صورتها: $s^2 - \text{رقم}$ أو $\text{رقم} - s^2$

مثال:

$$1) s^2 - 4 = (s+2)(s-2)$$

$$2) s^2 - 25 = (s+5)(s-5)$$

$$3) s^2 - 9 = (s+3)(s-3)$$

$$4) s^2 - 16 = (s+4)(s-4)$$

$$5) \left(s + \frac{1}{4}\right)\left(s - \frac{1}{4}\right) = s^2 - \frac{1}{16}$$

٢) مجموع مربعين

صورتها: $s^2 + \text{رقم}$ أو $\text{رقم} + s^2$


الحل لا تحل

مثال: $= 4 + s^2$

مثال: $= s^2 + 9$



٣) فرق ومجموع مكعبين



الأصل

$$\text{الحل} \quad (s^3 - u^3) = (s - u)(s^2 + su + u^2)$$

ثاني	\times	ثاني	الأول	عكس	الأول	ثاني	الأول	ثاني	الأول
ثاني			موجب	تربيع			تربيع		

مثال:

$$(1) \quad s^3 - 27 = (s - 3)(s^2 + 3s + 9)$$

$$(2) \quad s^3 + 64 = (s + 4)(s^2 - 4s + 16)$$

$$(3) \quad s^3 - 1 = (s - 1)(s^2 + s + 1)$$

$$(4) \quad s^3 + 8 = (s + 2)(s^2 - 2s + 4)$$

$$(5) \quad 27 - s^3 = (s - 3)(s^2 + 9s + 27)$$

٤) العبارة التربيعية صورتها: ٣ حدود أولها s^2

مثال:

$$(1) \quad s^2 + 8s + 6 = 8 + 6 + s^2 \quad \text{عددان ضربهم } 8 \quad \text{وجمعهم } 6$$

أول إشارة \blacktriangleleft حاصل ضرب الإشارتين $(s+4)(s+2)$

$$(2) \quad s^2 - 2s + 3 = 3 + 2 - s^2 \quad \text{عددان ضربهم } 2 \quad \text{وجمعهم } 3$$

$(s-1)(s-2)$




$$3) \boxed{5} \quad \boxed{4} \quad \boxed{4} \quad \boxed{5} - \boxed{s} = \text{عدد ضربهم} \quad \boxed{4} \quad \text{و جمعهم} \\ (s-4)(s-1)$$

$$4) \boxed{6} \quad \boxed{1} \quad \boxed{6} - \boxed{s} = \text{عدد ضربهم} \quad \boxed{6} \quad \text{وطرحهم} \\ (s-3)(s+2)$$

$$5) \boxed{4} \quad \boxed{4} \quad \boxed{4} - \boxed{s} = \text{عدد ضربهم} \quad \boxed{4} \quad \text{وطرحهم} \\ (s+4)(s-1)$$

٥) عامل مشترك (بجب صغير)



$$\text{العامل: } 1) \quad s^5 - 10$$

$$\text{العامل } 5) \quad (s-2) \quad \text{عامل مشترك}$$

$$2) \quad s^8 - 4$$

$$\text{العامل } 4) \quad (s^2 - 1)$$

$$3) \quad s^2 - 5s$$

$$\text{العامل } s(s-5)$$



:الحل :الخط

$$\boxed{\frac{7-5}{4}} = \frac{12-0}{4} \Leftarrow \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \cancel{-} \\ 1 \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \\ 4 \\ \cancel{-} \\ 4 \\ 1 \end{array} \quad (3)$$

:الحل :الخط

$$\boxed{\frac{3}{2}} = \frac{4-2}{2} \Leftarrow \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \cancel{-} \\ 1 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ \cancel{-} \\ 2 \\ 1 \end{array} \quad (4)$$

:الحل :الخط

$$\boxed{\frac{23}{20}} = \frac{8+10}{20} \Leftarrow \begin{array}{c} 2 \\ 0 \\ + \\ 0 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ 4 \\ \cancel{+} \\ 4 \\ 2 \end{array} \quad (5)$$

بالضرب $\leftarrow \frac{\text{بسط} \times \text{بسط}}{\text{مقام} \times \text{مقام}}$

:الخط

$$\boxed{\frac{5}{6}} = \frac{2 \times 5}{2 \times 6} \Leftarrow \frac{10}{12} = \frac{2}{2} \times \frac{5}{4} \quad (1)$$

$$\boxed{6} \Leftarrow \frac{12}{2} = \frac{4}{1} \times \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\boxed{\frac{7}{6}} = \frac{1}{2} \times \frac{7}{3} \quad (3)$$

$$\boxed{\frac{1}{3}} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} \Leftarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \quad (4)$$



❖ تبسيط الكسور

$$\boxed{\frac{1}{2}} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} \quad \text{الحل} \quad \frac{2}{4} \quad (1)$$

❖ جد قيمة ما يلي:-

$$\boxed{\frac{1}{3}} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} \quad \text{الحل} \quad \frac{5}{15} \quad (1)$$

$$\boxed{\frac{1}{3}} = \frac{1 \times 3}{3 \times 3} \quad \text{الحل} \quad \frac{3}{9} \quad (3) \\ 1 + 3 \div 3 + 6 - (2)$$

$$\boxed{\frac{2}{3}} = \frac{2 \times 8}{3 \times 8} \quad \text{الحل} \quad \frac{16}{24} \quad (4)$$

$$\boxed{\frac{3}{2}} = \frac{3 \times 5}{2 \times 5} \quad \text{الحل} \quad \frac{5 \times 2 + 5}{10} \quad \frac{15}{10} \quad (3)$$

$$\boxed{\frac{4}{9}} = \frac{2 \times 4}{2 \times 9} \quad \text{الحل} \quad \frac{8}{18} \quad (6) \\ 3 \times 5 + \frac{8}{4} - \frac{8}{3} \quad \frac{15}{3} \quad (4)$$

$$3 \times \frac{5}{2} - 2 \times \frac{7}{3} \quad (5)$$

$$3 + \frac{2}{3} \times 5 + 8 - (6)$$



امتحان تأسيس

❖ جد قيمة ما يلي:-

$$(3+4)-2 \times 5 = 1$$

$$1 + 3 \div 3 + 6 - 1 = 2$$

$$5 \times 2 + \sqrt{60-1} = 3$$

$$3 \times 5 + \frac{\text{صفر}}{4} - \sqrt[3]{(8)} = 4$$

$$3 \times \frac{5}{2} - 2 \times \frac{7}{3} = 5$$

$$3 + \frac{2}{3} \times 5 + 8 - 1 = 1$$



❖ حل المعادلات الآتية:-

$$1) s^4 - s^3 + s^2 - s^1$$

$$2) s^7 - s^2 - s^3 + s^6 - s^1$$

$$3) (s^5 - s^3)$$

$$4) \left(s^{\frac{1}{2}} - s^2 \right)^0$$

$$5) \frac{s^8}{s^4} - (s^5 - s^2) \circ$$

$$6) (s^1 - s^2)(s^5 + s^3)$$



❖ حل كل مما يلي:-

$$(1) s^2 - s^3$$

$$(2) s^2 - 64$$

$$(3) s^3 - 64$$

$$(4) s^2 - \frac{1}{9}$$

$$(5) s^2 - 3s - 28$$

$$(6) s^3 - s^8$$

$$(7) s^{27} + s^4$$

$$(8) s^2 - 3s - 4$$

$$(9) s^3 - s^2 - 28s$$

$$(10) 4s^2 - 4$$

