الرياضيات للعلمي والصناعي

▲ ps.**WATAD**.me موقع وتـد التعليمي

دوسية

حساب التفاضل

تحتوي على أكثر من 300 سؤال

الرياضيات االعلمي والصناعي



الأستاذ حسن الطريفي

حساب التفاضل















الفــــهــــرس

| حرس الاول: متوسط التغير | (/-1) |
|--|----------------|
| حرس الثاني: قواعد الاشتقاق | (٤٠-٩) |
| حرس الثالث: مشتقات الاقترانات المثلثية | (٤٦-٤١) |
| حرس الرابع: قاعدة لوبيتال ومشتقة الاقتران الاسي واللوغاريتمي | (07-57) |
| حرس الخامس: تطبيقات هندسية وفيزيائية | (vo-ov) |
| حرس السادس: قاعدة السلسلة | (,4-17) |
| حرس السابع: الاشتقاق الضمني | (1 • 7 - 9 •) |

حديث من القلب الى القلب

- اخواني واخواتي الطلاب ان شاء الله تكون هاي السنة سنة خير عليكم وتحققو اعلى المعدلات وتدخلو التخصصات الي بتتمنوها، ولكن لكل شيء جميل ولكل فرحة تعب وثمن ولكل مجتهد نصيب واتمنى انه ربنا يعطيكم ع قد تعبكم واجتهادكم وأكثر.
- طابي الاعزاء اعلموا علم اليقين انه هذه الدوسية كافية ووافية باذن الله لحتى تتمكنو من هاي الوحدة بأفضل صورة وحال، وكنت حريص انه تشمل تدريبات واوراق عمل واسئلة الكتاب واسئلة خارجية ووزارية حتى لا يحتاج اي طالب منكم لاي مصدر خارجي، وثقو تماماً انه بعد دراسة هاي الوحدة أنك تكون قادر على حل اي سؤال وزاري باذن الله.
- واعلموا جيداً أني حريص كل الحرص على نجاح كل طالب فيكم مهما كان مستواه، لأنه نجاحكم من نجاحي وان شاء الله تكونو من الناجحين والأوائل وفالكم التوفيق والنجاح باذن المولى عز وجل.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

الدرس الأول: متوسط التغير

إذا كان
$$= \mathfrak{O}(m)$$
 وتغيرت س من m_{Λ} إلى m_{Λ} فإنه:

(۱) التغیر فی س
$$\Delta = \omega_{\gamma} - \omega_{\gamma}$$
 ویقرأ دلتا س.

$$(\gamma)$$
 التغير في $\upsilon(m)$ يمثل $\Delta ص = \upsilon(m_{\gamma}) - \upsilon(m_{\gamma})$

$$\frac{\Delta_{(w_{\gamma})} - \omega_{(w_{\gamma})} - \omega_{(w_{\gamma})}}{\Delta_{(w_{\gamma})}} = \frac{\omega_{(w_{\gamma})} - \omega_{(w_{\gamma})}}{\omega_{(w_{\gamma})}}$$
 متوسط التغير يمثل $\Delta_{(w_{\gamma})}$

مثال:

$$m + \infty - \infty + \infty$$
 إذا كان $\sigma(m) = \infty$

جد:

ر۱)
$$\Delta$$
س عندما تتغیر س من -1 إلى ۲.

(۲) التغير
$$u(w)$$
 عندما تتغير س من $u(v)$

(٣) متوسط التغير في
$$v(m)$$
على نفس الفترة.

(مثال:

مثال:

 $\pi \cdot \left[\pi \cdot \frac{\pi}{\tau}\right]$ إذا كان $\sigma(m) = \pi$ ا الفترة $\pi \cdot \frac{\pi}{\tau}$ إذا كان الفترة $\pi \cdot \frac{\pi}{\tau}$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان
$$v(m)=m+1$$
 ه جد متوسط التغير في الفترة من ١ إلى ١.

مثال:

إذا كان $\upsilon(m) = (m^{7} + m)^{-1}$ وكان مقدار التغير في قيمة الاقتران $\upsilon(m)$ يساوي $\frac{1}{m}$ عندما تتغير س من ۱ إلى m , جد قيمة m , حيث أن m , \rightarrow ،

مثال:

إذا كان $\upsilon(m) = a(m) - m^{7}$ وكان متوسط التغير في الاقتران a(m) في الفترة [-٢، ٣] يساوي ٥، جد متوسط التغير في $\upsilon(m)$ على نفس الفترة.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال:

إذا كان متوسط التغير للاقتران
$$\upsilon$$
 في الفترة [٣،١] يساوي ٥، وكان $\upsilon(1) \times \upsilon(1) = 1$ ، وكان هر $\upsilon(m) = \frac{1}{\upsilon(m)}$ ، فجد متوسط التغير للاقتران ه $\upsilon(m)$ على الفترة نفسها.

مثال:

مثال:

ا لقها ضــــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال:

إذا كان $v(m) = \sqrt{|\nabla m|}$ ، وكان متوسط التغير في v(m) يساوي $\frac{1}{7}$ عندما تتغير س من $\frac{1}{7}$ إذا كان $v(m) = \sqrt{|\nabla m|}$ عندما تتغير س من $\frac{1}{7}$ إلى ب، جد قيمة بحيث ب $\frac{1}{7}$.

مثال:

إذا كان متوسط التغير للاقتران $v(w) = w + L_{e_{\mathbf{a}}}^{w}$ ، w > v عندما تتغير w من $v(w) = w + L_{e_{\mathbf{a}}}^{w}$.


مثال:

إذا كان v(w) = 1 + بw+ ، اثبت أن متوسط التغير عندما تتغير w من ٢ إلى v يساوي v

الأستاذ: حسن الطريفي

المعنى الهندسي لمتوسط التغير:

 $((v_{\gamma})^{0})$ القاطع: هو خط مستقيم يقطع منحنى الاقتران في نقطتين $(v_{\gamma})^{0}$ ، $(v_{\gamma})^{0}$ ، $(v_{\gamma})^{0}$



وميل القاطع =
$$\frac{\Delta_{\infty}}{\Delta_{\infty}} = \frac{\sigma(\omega_{\gamma}) - \sigma(\omega_{\gamma})}{\omega_{\gamma} - \omega_{\gamma}}$$
 أو ميل القاطع =ظاه، حيث ه هي الزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور السينات الموجب

ملحظة: ميل المستقيم (القاطع) = متوسط التغير = ظاه.

مثال:

إذا قطع المستقيم ل منحنى الاقتران $\upsilon(m) = m+$ جا۲m ، في النقطتين $(\cdot \)\upsilon(\cdot)$ ، $((\cdot \)\upsilon(\cdot))$ جد: (٢) قياس زاوية ميل المستقيم ل. (١) ميل المستقيم ل

جد ميل القاطع المار بالنقطتين (٥،٢)، (١٠،٤) جد ميل القاطع لمنحنى الاقتران ٥ (س) الموضح في الواقعتين على منحنى الاقتران v(m)، ثم جد الشكل المجاور. متوسط التغير في الفترة [٤،٢].

الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

إذا كان القاطع المار بالنقطتين (١) (0))، إذا قطع المستقيم ل منحنى (0) في النقطتين (۳ υ (۳)) یضع زاویة قیاسها ۱۳۰ مع (۱٬۱۱) ، (۳ υ وصنع زاویة قیاسها ۱۳۰ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، فجد متوسط التغير الاتجاه الموجب لمحور السينات، جد متوسط التغير في للاقتران في الفترة [٣،١]

 $1 - {}^{\mathsf{T}} \omega + (\omega) = {}^{\mathsf{T}} \omega + (\omega) + \omega$ الاقتران ه

المعنى الفيزيائي لمتوسط التغير:

إذا كانت ف $\upsilon=0$ (م) هي اقتران المسافة التي يقطعها الجسم، ن تمثل الزمن، فإن السرعة المتوسطة = متوسط التغير في المسافة.

$$\frac{\Delta \dot{\upsilon}}{\Delta \nu} = \frac{\upsilon(\nu) - \upsilon(\nu)}{\Delta \nu} = \frac{\upsilon(\nu)}{\upsilon}$$
السرعة المتوسطة

مثال:

يتحرك جسم على خط مستقيم، بحيث بعده ف بالأمتار من النقطة (و) بعد ن من الثواني يعطي بالقاعدة $\upsilon(v) = v^{+} + \lambda v$ ، جد ما یلی:

(١) السرعة المتوسطة في الفترة [٣٠٠].

(٢) إذا كانت السرعة المتوسطة في الفترة [١٤١] تساوي ١٣ م/ ث جد قيمة ١.

ورقــة عمــل

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

(۱) إذا كان υ (س) اقترانا، وكان υ (۳) = υ (٥) υ (١) إذا كان υ (س) اقترانا، وكان υ (٣) عناوي:

- د) ۱۰
- ج_) ٢
- س) ٣

أ) ٥

(۲) إذا كان v(m) = m v(m)، وكان متوسط تغير الاقتران v(m) في الفترة v(m) = m يساوي v(m)

(-1) ک (-1) فیا قیمه ک (-1):

- د) ۲
- ج_) ١
- ر) (
- أ) ٢

(٣) إذا كان متوسط تغير الاقتران $v(m) = m^{7} - m$ في الفترة [٢٢١] يساوي ١٦، 1 > 0 فأن أتساوي:

- د) ۲۲
- ج_) ۱
- ب) الم
- أ) ٢

(٤) إذا كان متوسط التغير في الاقتران $v(m) = m^{-1} + 1$ في الفترة [ب،٢] هو -٦، فأن قيمة الثابت ب هي:

- د) ځ
- ج_) ٤
- ر) ۲
- أ) ٢

هي النقطع المستقيم ل منحنى الاقتران (σ) في النقطتين (σ) (σ) ، (σ) في النقرة النقطين (σ) في النقرة النقرة (σ) في النقرة النقرة المستقيم ل علماً بأن التغير في الاقتران (σ) في الفترة (σ) يساوي (σ) في النقرة ال

- $\frac{\pi V}{2}$ (2
- $\frac{\pi^{\gamma}}{\xi}$ (ج
- $\frac{\pi}{\varsigma}$ (ب
- $\frac{\pi^{\circ}}{\xi}$ (أ

سـؤال

الأستاذ: حسن الطريفي

الجواب: ١=٤

ســؤال

إذا كان متوسط تغير الاقتران ஶ (س) في الفترة [٢،١] يساوي ٤، ومتوسط تغير ஶ (س) في الفترة [٢،٠] يساوي ٨، فها متوسط تغير الاقتران ஶ (س) في الفترة [٥،١]؟

الجواب: ٧

ســؤال

إذا كان متوسط التغير للاقتران $v\left(w
ight)=\sqrt{100}$ في الفترة $\left[v\left(w
ight)
ight]$ بنا قيمة الثابت ب؟

الجواب: ب = ٢

ســؤال

إذا كان هـ (س) = $(\upsilon(m)+m)^{\Upsilon}$ وكان متوسط التغير $\upsilon(m)$ في الفترة [۲،۵] يساوي Υ ، ومتوسط تغير هـ (m) في نفس الفترة يساوي Υ ، فها قيمة $\varpi(\circ)+\varpi(\Upsilon)$?

الجواب: ٣

ســؤال

إذا كان المستقيم القاطع لمنحنى الاقتران v(w) في النقطتين v(w) ، v(w) يصنع زاوية مقدارها v(w) و المستقيم القاطع لمنحنى الاقتران v(w) في النقرة v(w) المع محور السينات الموجب. احسب متوسط التغير للاقتران هv(w) المجواب: v(w) المجواب: v(w)

الحرس الثاني: قواعد الاشتقاق

رموز المشتقة الاولي للاقتران $\omega = \mathcal{U}(m)$ هي:

$$v = \frac{v}{v} \cdot \frac{v}{v} \cdot$$

علاقة المشتقة الاولى بمتوسط التغير (تعريف المشتقة)

الخلاصة التعريف العام للمشتقة يمثل:

$$\frac{\upsilon}{\upsilon} = \frac{\upsilon}{\upsilon} = \frac{\upsilon}$$

$$(7) \ \upsilon (m) = \frac{\upsilon (m + a) - \upsilon (m)}{a}$$

مثال:

جد ع أ (س) لكل مما يلي باستخدام التعريف العام للمشتقة:

$$^{\mathsf{Y}} \omega = (\omega) \upsilon (\mathsf{Y}) \qquad \qquad \circ - \omega \mathsf{Y} = (\omega) \upsilon (\mathsf{I})$$

تدریب:

جد v^{-1} لكل مما يلي باستخدام التعريف العام للمشتقة:

$$^{\mathsf{w}} \omega = (\omega) \upsilon (1)$$

$$\omega + {}^{\mathsf{T}} \omega = (\omega) \upsilon (\mathsf{T})$$

$$\Upsilon - \omega \gamma = (\omega) \upsilon (\Upsilon)$$

قواعد الاشتقاق

إذا كان
$$\upsilon(w) = l \rightarrow \upsilon$$
 $(w) = v$

$$\upsilon(\omega) = \circ \rightarrow \upsilon$$
 صفر

$$\upsilon(w) = \frac{1}{2} + \upsilon(w) = -\omega$$

$$\upsilon(w) = \sqrt{r} \rightarrow \upsilon (w) = \cot u$$

$^{\sim}$ مشتقة س $^{\sim}=$ مشتقة

$$^{\prime}$$
 $^{\prime}$ $^{\prime}$

 $\frac{1-}{\mathsf{v}} = (\mathsf{w}) \quad \mathsf{v} \leftarrow \mathsf{w} \frac{1-}{\mathsf{v}} = (\mathsf{w}) \mathsf{v}$

 $\pi = (\omega)$ $\omega \leftarrow \omega \pi = (\omega) \omega$

 $\upsilon(\omega) = \omega \longrightarrow \upsilon(\omega) = \omega$

 $\overline{\mathsf{Y}}_{\mathsf{V}} = (\mathsf{w})^{\mathsf{T}} \cup \mathsf{v} \leftarrow \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = (\mathsf{w}) \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf{V}} = \mathsf{v}_{\mathsf{V}} \cup \mathsf{v}_{\mathsf$

$$^{7}\omega V = (\omega)^{2}\omega \leftarrow ^{4}\omega = (\omega)\upsilon$$

$$^{\vee}$$
 $_{\omega}$ $_{\lambda}$ $_{\omega}$ $_{\omega}$

$$\upsilon(\omega) = \omega^{\prime} \rightarrow \upsilon(\omega) = 1$$

مشتقة س ←۱

$$1 = (w) \quad \omega \leftarrow (w) = (w)$$
 إذا كان ω

$$1 = (\omega)^{\prime} \upsilon \leftarrow \omega = (\omega) \upsilon$$

$$1 = (\xi) \ \upsilon \leftarrow \xi = (\xi) \upsilon$$

مشتقة الثابت اس ← ا

$$\mathfrak{f} = (\mathfrak{w}) \stackrel{\frown}{} \mathfrak{v} \leftarrow \mathfrak{w} = (\mathfrak{w})$$
 إذا كان \mathfrak{v} $(\mathfrak{w}) = \mathfrak{f}$

مشتقة س
$$\frac{1}{v} = \frac{1-v}{v}$$
 مشتقة مشتقة س

$$\frac{\mathsf{m}-}{\frac{\dot{\Lambda}}{\circ}} = \frac{\overset{\Lambda-}{\circ}}{\circ} \, \mathcal{m} \, \frac{\mathsf{m}-}{\circ} \leftarrow \frac{\overset{\Psi-}{\circ}}{\circ} \, \mathcal{m}$$

$$\frac{1-}{\frac{\varepsilon}{m}} = \frac{\varepsilon^{-}}{m} \sqrt{\frac{1-}{m}} \leftarrow \frac{\frac{1-}{m}}{m} \sqrt{\frac{1-}{m}}$$

$$\frac{\Upsilon-}{\frac{Y}{\xi}} = \frac{\frac{Y-}{\xi}}{2} \omega \frac{\Upsilon-}{\xi} \times \Upsilon \leftarrow \frac{\frac{T-}{\xi}}{2} \omega \Upsilon = \frac{\Upsilon}{\frac{T}{\xi}} \omega$$

مشتقة جمع الاقترانات

$$(\omega) = (\omega) + \gamma(\omega)$$
 إذا كان $\omega(\omega) = \gamma(\omega)$

$$(\omega)^{\prime}$$
فإن $\psi^{\prime}(\omega)=\omega^{\prime}(\omega)$ فإن

$$\mathcal{U}(\omega) = \omega^{7} + \omega^{8} + \nabla \omega^{8} + 4\nabla \omega^{8} + 4\nabla \omega^{8}$$

$$\mathbf{U}(\omega) = \omega^{7} + \omega^{8} + 2\omega^{8}$$

$$\omega \Upsilon + \frac{1}{2}\omega + \frac{1}{4}\omega + \frac{1}{4}\omega + \omega \Upsilon = (\omega)$$

$$= (\omega)^{2}\omega$$

$$\lambda^{-1}\omega^{-$$

$$^{9}\omega\overline{\Psi}$$
 1 1 2 2 4 4 5 5 6 5 6

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\gamma}}} \omega \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\gamma}}} \omega \frac{1}{\sqrt{\frac{1}$$

amibb
$$\frac{1}{\sqrt{\gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}}$$

$$n^{-1} = -1$$
 مشتقة س $\frac{\xi}{\omega} = 0$ مشتقة س $\frac{\xi}{\omega} = 0$ مشتقة س $\frac{\xi}{\omega} = 0$ مشتقة س

التفاضــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$\frac{1}{7}\omega \Upsilon + \frac{1}{2\omega} + \frac{7}{7}\omega = (\omega)\upsilon$$

$$\omega(\omega) = \pi\omega^{1} + \frac{1}{\pi}\omega^{-1} + \alpha$$

مشتقة طرح الاقترانات

إذا كان
$$v(m) = a(m) + \gamma(m)$$

فأن
$$\mathcal{O}^{\prime}(w) = \mathbf{a}^{\prime}(w) + \gamma^{\prime}(w)$$

$$abla = \omega^{\gamma} - 3\omega^{\gamma} - 7\omega = 0$$

$$abla = (\omega)^{\gamma}$$

$$abla \cdot (\omega) = -6\omega - \sqrt{\omega^2 - \gamma}$$

$$abla \cdot (\omega) = 0$$

$$\frac{V}{Y} - wY = Yw^{-1} - Yw^{-1} - Yw = 0$$

$$U(w) = (w)$$

مشتقة ضرب اقترانين

$$(w) = v(w) \times a(w)$$
 إذا كان ل

$$(w) = \mathcal{U}(w) \times \mathbf{a}$$
فأن ل ُ (س) فأن ل

$$+ (\omega)^{\prime} \upsilon \times (\omega) +$$

$$=(|V_0| \times (|U_0|)^{1/2} + (|U_0|)^{1/2})$$

مشتقة جمع وطرح الاقترانات

$$\lambda - \omega \Upsilon + {}^{\Upsilon} \omega \xi - {}^{\Upsilon} \omega \Upsilon = (\omega) \upsilon$$
$$= (\omega)^{\Upsilon} \upsilon$$

$$abla + \frac{1}{6}\omega - \frac{1}{4}\omega + \frac{1}{4}\omega = (\omega)$$

$$abla = (\omega)^{\frac{1}{2}}\omega$$

$$V = V \omega = V \omega^{\frac{1}{q}} + c \omega^{\frac{1}{q}} + c \omega^{\frac{1}{q}} + c \omega^{\frac{1}{q}}$$

$$= (\omega)^{\frac{1}{q}} \omega^{\frac{1}{q}}$$

مثال:

$$(\Upsilon + \omega \circ) (\Upsilon + \Upsilon \omega) = (\omega) U (\Upsilon)$$

$$\left(1+\circ\omega+{}^{\mathsf{Y}}\,\omega\right){}^{\mathsf{Y}}\,\omega=\left(\omega\right)\mathcal{U}\,\left(\mathsf{Y}\right)$$

$$\left(1+\frac{1}{2}\omega\right)\left(1+\frac{1}{2}\omega\right)=\left(\omega\right)\upsilon\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$(^{\xi}\omega+\xi)(^{\Upsilon}\omega+\Upsilon)(^{\Upsilon}\omega-\Upsilon)=(\omega)\upsilon(\xi)$$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

إذا كان
$$v(w) = w^{7}$$
ه (w) و كان ه $(v) = v^{7}$ ه و كان ه $(v) = v^{7}$ فأن v^{7} $(v) = v^{7}$ تساوي:

إذا كان
$$\upsilon(w) = w$$
ك (w) جد $\upsilon(v)$ إذا كان $\upsilon(v) = -7$ ، ك $(v) = 3$.

الجواب: ٧٥

إذا كان
$$v(m)=a(m)$$
ل $v(m)$ وكان

$$U(1) = Y$$
، $U(1) = Y$ ، ه (۱) = Y ، $U(1) = Y$ ، $U(1) = Y$ جد $U(1)$.

الجواب: ٥

$$(\omega)$$
 ه (ω) (ω) (ω) (ω)

الجواب: ١٤

الجواب: ١٥

مشتقة ضرب ٣ اقترانات

إذا كان ل
$$(\omega) = \mathcal{O}(\omega) \times \mathbf{a}(\omega) \times \gamma(\omega)$$
، فإن:

$$(\omega) = \omega \times \omega + (\omega) \times \omega \times (\omega) = (\omega)$$

مثال:

جد ن (س) لكل مما يلي:

$$(\omega \circ -1)(\Upsilon + \Upsilon \omega)(1 + \Upsilon \omega) = (\omega) \omega (1)$$

$$(\omega \Upsilon) (^{1}\omega + \omega \circ) (^{1}\omega + 1) = (\omega) \upsilon (\Upsilon)$$

$$(\omega)(\omega)(\xi-\omega)(\xi-\omega) = (\omega)(\omega)(\psi)$$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مشتقة القسمة

إذا كان ل
$$(w) = \frac{v(w)}{a(w)}$$
 فإن:

$$U^{(w)} = \frac{(w)U^{(w)}U^{(w)}}{(w)} = \frac{(w)U^{(w)}}{(w)}$$

$$\frac{'(\text{المقام})(\text{البسط})'-(\text{البسط})}{(\text{المقام})'}=($$
ل س $)$

مثال:

جد ن (س) في كل مما يلي:

$$\frac{\omega}{1+\omega} = (\omega) \upsilon (1)$$

$$\frac{1+\frac{}{}^{\Upsilon}\omega\Upsilon}{\circ-\omega\Upsilon}=(\omega)\upsilon(\Upsilon)$$

$$\frac{1+\frac{m}{m}}{1+\frac{m}{m}} = (m) \upsilon \quad (m)$$

$$\frac{1+\frac{\pi}{\omega}}{1+\frac{\pi}{\omega}} = (\omega) \upsilon (\xi)$$

$$\frac{\omega^{w}+1}{1+\frac{v}{\omega}}=(\omega)\upsilon \quad (0)$$

اً لَتَّهُا صَــلُ الْأَسْتَاذِ: حسن الطريفي

059-488-5006

مشتقة قسمة تثبت

إذا كان
$$\upsilon(w) = \frac{(w)}{t}$$
 فإن $\upsilon(w) = \frac{(w)}{t}$

مثال:

جد ں ﴿ (س) في كل مما يلي:

$$\frac{\Upsilon + {}^{\Upsilon} \omega}{\Upsilon} = (\omega) \upsilon (1)$$

$$\frac{\xi - \omega \Upsilon - \Upsilon \omega \Upsilon + \Upsilon \omega}{q} = (\omega) \upsilon (\Upsilon)$$

$$\frac{\sqrt{3}\sqrt{1+\sqrt{2}\sqrt{1+2}}}{3} = (\sqrt{2})\sqrt{2}$$

$$\frac{\omega-1}{V}=(\omega)\upsilon(o)$$

ثابت م**شتقة قسمة** اقتران

$$\frac{1}{|\omega|}$$
 ، فإن $\sigma(\omega) = \frac{1}{|\omega|}$ ، فإن $\sigma(\omega) = \frac{1}{|\omega|}$ ، فإن $\sigma(\omega) = \frac{1}{|\omega|}$

ومنه:
$$v = (w) = \frac{-البسط × مشتقة المقام}{(المقام)}$$

أمثلة:

$$(\omega)$$
 $\sim \frac{0}{V + \omega} = (\omega) \upsilon (1)$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$(\omega)$$
 مجد $\frac{\Psi-}{1+\frac{\Upsilon}{\omega}}=(\omega)$ (۲)

$$(\omega)$$
 $\sim \frac{\gamma}{1+\frac{1}{\gamma}} = (\omega) \upsilon (\Upsilon)$

$$(\circ)$$
 إذا كان $\mathcal{O}(\omega) = \frac{\alpha(\omega)}{\omega + 1}$ ، $\omega \neq -1$ ، $\omega(\Upsilon) = 1$ ، ه $(\Upsilon) = \Upsilon$ ، فإن $\omega(\Upsilon) = 1$

الجواب: ٢

$$(\Upsilon)$$
 $(\Upsilon) = \Upsilon$ ، $(\Upsilon) = \Upsilon$ ، فإن $(\Upsilon) = \Upsilon$ يساوي (Υ)

$$\left(\frac{\Upsilon 1-}{\xi}\right)$$
 :الجواب

$$(\mathsf{Y})^{\mathsf{T}}(\mathsf{V}) = (\mathsf{V})^{\mathsf{T}}$$
، ه $(\mathsf{V}) = \mathsf{V}$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

رس)
$$= \frac{1}{2}$$
، إذا كان υ (١) $= 0$ ، جد أ.

الجواب: -٣٦

$$(4) \quad U(m) = \frac{m+o}{r-1}, \quad \text{جد } U(n)$$

الجواب: ٤

$^{\prime\prime}((\omega)\upsilon)=$ $^{\prime\prime}(\omega)$

$$(\omega)^{\sim}$$
 اِذَا کان $\omega=(\upsilon(\omega))^{\sim}$ فأن $\omega=(\upsilon(\omega))^{\sim}\times$ ا

1
 ··· $(\omega Y + 1) = (\omega) \upsilon$

$$^{9}\left(\Upsilon+^{\Psi}\omega\right)=\left(\omega\right)\upsilon$$

$$^{17}(\omega\xi - ^{7}\omega + 1) = (\omega)$$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$\frac{1}{\psi}((\omega)\upsilon) = 0$$

$$(\omega)^{\frac{1}{\nu}}$$
 إذا كان $\omega = (\upsilon(\omega))^{\frac{1}{\nu}}$ ، فأن $\omega = \frac{1}{\nu} \times (\upsilon(\omega))^{\frac{1-\nu}{\nu}} \times \upsilon(\omega)$.

مثال (۱):

$$(\omega)$$
 $\sim (\omega)^{\frac{1}{2}} (\pi + \nabla) = (\omega)^{\frac{1}{2}}$

مثال (۲):

$$(\Upsilon)$$
 ر کا $=$ ((Υ)) $=$ ((ϖ)) (ϖ) ر کا (Υ) ، جد (Υ)

مثال (٣):

$$(\mathfrak{m})^{'}$$
 جد $\mathfrak{v}^{'}$ بجد $\mathfrak{v}^{'}$ إذا كان $\mathfrak{v}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{v}^{'}$ ، $\mathfrak{v}^{'} = \mathfrak{v}^{'}$ ، جد $\mathfrak{v}^{'}$ بجد $\mathfrak{v}^{'}$

مشتقة الجذور

تذكرأن:

$$\frac{1}{r}\left(0+r\right) \leftarrow 0 + r \sqrt{r}$$

$$\frac{1}{r}\left(1-r^{2}\right) \leftarrow 0 + r^{2} \sqrt{r^{2}}$$

$$\frac{1}{r}\left(1-r^{2}\right) \leftarrow 1 - r^{2} \sqrt{r^{2}}$$

$$\stackrel{1}{\circ} (1 + 1) \longrightarrow \overline{(1 + 1)} \stackrel{1}{\circ}$$

$$\stackrel{1}{\circ} (1 + 1) \longrightarrow \overline{(1 + 1)} \stackrel{1}{\circ}$$

$$\stackrel{1}{\circ} (1 + 1) \longrightarrow \overline{(1 + 1)} \stackrel{1}{\circ}$$

جد ں ؑ (س) في كل مما يلي:

$$\overline{\Upsilon(V + \Upsilon(O))} = (OV + \Upsilon)$$

$$(\mathcal{V}) \cup (\mathcal{V}) = (\mathcal{V}) \cup (\mathcal{V})$$

$$\begin{array}{ccc}
& & & & & & \\
& & & & & \\
& & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
& & & & \\
& & & & \\
& & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
& & & \\
& & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
& & & \\
& & & \\
\end{array}$$

مشتقة الجذر التربيعي

$$\frac{1}{\frac{1}{|w|}} = \frac{1}{|w|}$$
 إذا كان $v(w) = \sqrt{|w|}$ فأن $v(w) = \frac{1}{|w|}$

$$\frac{(\omega)}{|\omega|} = \sqrt{|\omega|}$$
 فأن $\omega = \sqrt{|\omega|}$ فأن $\omega = \sqrt{|\omega|}$

$$(w)$$
 جد v $\overline{(w)}$ إذا كان $v(w) = \sqrt{w^{7} + \gamma w + 1}$ ، جد v

$$(1)$$
 ہجد $\sqrt{\lambda + 1}$ ، جد $\sqrt{(1)}$

$$(1)$$
 رس $= \sqrt{1 \cdot 100}$ ، جد $\sqrt{100}$

$$(\Upsilon)$$
 $= \frac{(m^{7}+1)(m+1)}{m}$ $= (m)$ $= (m)$

تدریب:

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

(1) إذا علمت
$$\frac{\upsilon(3)-\upsilon(7)}{3-7} = 1$$
، وكان $\upsilon(\omega) = \upsilon(\omega) + \omega^{7}$ فأن $\upsilon(7)$ يساوي:

(۲) إذا كان
$$\sigma(m) = m^{7} + om + \Lambda$$
، فأن $\sigma(m) = m^{7} + om + \Lambda$

$$(m)$$
 إذا كان $\upsilon(m) = \frac{m^{\frac{3}{2}}}{\Lambda} + m^{\frac{3}{2}}$ ، جد $\upsilon(m)$

7
 7 7 7 7 7

$$^{7}\mathcal{W}-\frac{^{9}\mathcal{W}-}{7}$$

$$(3)$$
 إذا كان ه $(m) = m + 0$ ، فأن ه (5)

$$=(\xi)^{\prime}$$
 نأن $\overline{\psi}$ $=(\omega)$ (٥)

$$\frac{1}{2}$$
 (ب

أ) ۱

$$(7)$$
 إذا كان (7) ه (7) ه (7) ه (8) ه (8) وكان ه (8)

/ (ج

التفاضــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$(V)$$
 إذا كان $(w) = w^{7}$ ه (w) ، وكان ه $(V) = 0$ ، ه $(V) = V$ ، فأن $(V) = V$

$$(\wedge)$$
 إذا كان $(\omega) = \omega^{\dagger}$ ه (ω) ، وكان ه $(\neg) = 0$ ، ه $(\neg) = 3$ ، فأن $(\neg) = 0$

(۹)
$$\left(\frac{\upsilon}{a}\right)$$
 (۱) $\left(\frac{\upsilon}{a}\right)$

(۱۰) إذا كان ه (س) اقتران كثير حدود وكان ه (۱) =
$$\circ$$
، ه $^{^{\prime}}(1) = -1$ ، فأن (ه $^{^{\prime}}(m)$) أبيساوي:

(١١) إذا علمت أن ه (س) قابل للاشتقاق وأن ه (٢) = ٣ ، ه (7) = -1 فجد (7) في كل مما يلي:

$$() \ \mathcal{O}(w) = \Upsilon w \Upsilon = ()$$

$$(i) \ \upsilon(w) = wa(w)$$

$$(c) \ \mathcal{O}(m) = \frac{\gamma m + 1}{\gamma a_{m}(m)}$$

$$(\overset{\mathsf{I}}{\leftarrow}) \ \mathcal{O}(w) = \mathscr{E}(w) - \frac{\mathsf{I}}{\mathscr{E}(w)}$$

(+ 1) إذا كان ل، هـ اقترانين قابلين للاشتقاق وكان ل(- 1) = 7 ، ل (- 1) = -1 ، هـ (- 1) = 3 ،

ھ َ
$$(-1) = -1$$
، فجد (-1) في كل مما يأتي:

$$\frac{(\omega)}{(\omega)} = (\omega) \cup (\omega) = (\omega) \cup (\omega) = (\omega) \cup (\omega) = (\omega) \cup (\omega) \cup (\omega) \cup (\omega) \cup (\omega) = (\omega) \cup (\omega$$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

الإجابات

| ١. | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | السؤال |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| ٲ | د | ج | د | ب | ٲ | ĺ | ب | ب | ĺ | الاجابة |

اجابة سؤال (١١):

$$\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1}} (2) \qquad \frac{1}{\sqrt{1-1}} (2)$$

اجابة سؤال (١٢):

(أ) - ۲۲

الاتصال والاشتقاق

الاتصال:

یکون الاقتران v(m) متصل عن m=1 إذا تحقق ما یلي:

(۱) النهاية موجودة نها
$$\upsilon(m) = \psi$$
 $m \rightarrow 1$

(۲) الصورة تساوي النهاية
$$\upsilon(1) = \dot{\upsilon}$$
 $\upsilon(m) = \dot{\upsilon}$ $m \rightarrow 1$

Y = m عند س انصال البحث اتصال

$$Y \succ \omega \leftarrow \left\{ \frac{\xi - \gamma \omega}{\omega - \gamma} \right\} = (\omega) \upsilon$$
 $Y \leq \omega \leftarrow \gamma - \omega$

 $Y = \omega$ عند س ابحث في اتصال $U(\omega)$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

متصلا عند س = ۱ ، جد أ، ب.

الجواب: أ=١، ب=٣

تدریب:

$$(1)$$
 $(m) = \begin{cases} 1m^7 + \mu & 3m < 7 \\ 7m = m & 6 \end{cases}$ وکان متصلاً عند $m = m$ جد اً، μ

$$Y = \omega$$
 عند (ω) عند (ω) ابحث اتصال (ω) عند (ω) عند (ω) (ω) عند (ω)

$$7 \prec m \leftarrow \frac{m - m - m}{m - m}$$
 $\Rightarrow m \rightarrow m$ $\Rightarrow m \rightarrow m$

الاشتقاق:

w عند w اقتراناً قابلاً للاشتقاق عند w، فأنه یکون متصلاً عند w

ملاحظات على النظرية:

(۱)
$$\upsilon$$
 قابل للاشتقاق \to υ متصل. (۲) υ غير قابل للاشتقاق \to υ غير متصل.

(٣) υ متصل \to ليس بالضرورة أن يكون قابل للاشتقاق.

التفاضلل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

7
اِذَا كَانَ 7 $^{$

مثال:

$$abla = rac{r}{w-r}$$
، ابحث قابلیة $abla = rac{r}{w}$ ابحث قابلیة $abla = rac{r}{w}$

مثال:

عند
$$w=1$$
 ، ابحث قابلیة v للاشتقاق عند $w=1$

مشتقة الاقتران المتشعب

- (١) نشتق كل قاعدة لوحدها ثم نزيل أي إشارة مساواة موجودة.
 - (٢) المشتقة عند الأطراف دائماً غير موجودة.
 - (r) المشتقة عند نقاط التحول (m)
- أو \underline{V} : ندرس الاتصال عند $\mathbf{v} = \mathbf{1}$ إذا كان متصل نكمل إذا لا $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{1})$ غ. م.

ثانياً: إذا كانت المشتقة من اليمين تساوي اليسار فأنها موجودة
$$\upsilon$$
 (۱) = υ (۱) وأني υ (۱) = υ (۱) = υ (۱) وأني υ (۱) = υ (۱) وأني υ (۱) = υ (۱) وأني υ (۱) وأني (۱) وأني υ (۱) وأني (۱) وأني (1) وأني

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

$$(\omega)$$
 (ω) (ω)

مثال:

$$Y \leq \omega_{0}$$
 ω_{0} ω_{0}

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$\begin{vmatrix}
1 & \omega & \omega & \omega \\
1 & \omega & \omega & \omega
\end{vmatrix} = (\omega) \omega$$

$$\begin{vmatrix}
1 & \omega & \omega \\
1 & \omega & \omega
\end{vmatrix} = (\omega) \omega$$

إذا كان ن (س) قابل للاشتقاق على ح، جدأ، ب

ابحث قابلية الاقتران للاشتقاق على ح،

$$1 \ge \omega_{\zeta} \frac{\xi}{1 + \omega}$$

$$1 < \omega_{\zeta} 1 + \omega$$

تدرىب:

$$1 \geq \omega$$
 $= \{ \omega \}$ $= \{ \omega \}$


ابحث قابلية الاشتقاق على مجاله واكتب قاعدة υ (س)

تدریب:

وكان v(m) قابلاً للاشتقاق عند v(m) فجد كلاً من الثابتين أ، ب.

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006



ملاحظات:

(1) |خطى | \rightarrow قابل للاشتقاق على ح- $\{$ صفره $\}$

مثال:

$$|w| \rightarrow w = 0$$
 المشتقة غ. م

$$|w-1| \rightarrow w = 1$$
 المشتقة غ. م

$$| \mathbf{7} \mathbf{w} + \mathbf{7} | \rightarrow \mathbf{w} = -\mathbf{7}$$
 المشتقة غ. م

(Υ) | تربيعي مميزه موجب \longrightarrow قابل للاشتقاق على ح- اصفاره}

$$\{1-1\} \rightarrow$$
قابل للاشتقاق على ح $\{1-1\}$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$\left| w - w - v \right|$$

$$m^{\gamma}-\gamma$$
 سو سفر

$$(m-1)(m+1)=0$$
 صفر

$$\cdot$$
 قابل للاشتقاق على ح $\{$

(۳) $|w|^{\Upsilon} = |w|^{\Upsilon}$ (نلغي المطلق إذا ما كان داخله مقدار تربيعي)

$$| (1-\omega) \rangle = | (1-\omega) \rangle = | (1+\omega) \rangle$$

$$| (Y - \omega) = | (W - Y) | = | (W - Y) |$$

(٤) $\sqrt{m^{Y}} = |m|$ (إذا كان ما داخل الجذر التربيعي مقدار تربيعي يتحول إلى مطلق)

$$\frac{1+mY-Ym}{m}$$

$$|1-\omega| = \sqrt{(\omega-1)^{\gamma}} =$$

مثال (۱):

إذا كان
$$\upsilon(w) = |\Upsilon - \Upsilon|$$
 ، جد ما يلي:

$$(1-)^{\prime}\upsilon(\xi)$$
 $(\cdot)^{\prime}\upsilon(\Upsilon)$

$$(\Upsilon)^{\prime} \upsilon (\Upsilon) \qquad (\Upsilon)^{\prime} \upsilon (\Upsilon)$$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريف

059-488-5006

مثال (۲):

$$\upsilon^{-}(m) = \frac{|m|}{m+1} = \omega^{-}(-1).$$

مثال (۳): درس – س

$$\upsilon + \left| 1 - \omega + {}^{\mathsf{T}} \omega \right| = (\omega) \upsilon$$

$$(1-)^{\mathsf{T}} \upsilon^{\mathsf{T}} = (1-)^{\mathsf{T}} \upsilon^{\mathsf{T}} = (1-$$

مثال (٤):

$$(v) = w |w| + |v|$$

التفاضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (٥):

$$U(w) = |w - o| + |vw| \quad \text{if } |vw| = 0$$

مثال (٦):

$$(1-)$$
 $= |w| + |w| + |w| = (1-)$

مثال (٧):

$$(\omega)$$
 $= |\omega|(\omega)^{\dagger} + 1)$ ، جد ω

تدریب:

[١] ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

$$(\cdot)$$
 υ (υ) ، فأن υ (1)

$$(1) \quad v \quad |1 + \omega - v - v| = (\omega) \quad v \quad (1)$$

$$(\Upsilon) \circ (W) = \sqrt{W \cdot (W)} \cdot (\Psi)$$

$$(1)$$
 (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7)

$$(1)$$
 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

$$(\cdot)^{\prime} \cup (\omega) = \sqrt{(\omega - \omega)^{\prime}} \cdot (\omega) = (\omega)^{\prime} \cup (\omega)^{\prime} \cup (\omega)^{\prime} = (\omega)^{\prime} \cup (\omega)^{\prime} \cup (\omega)^{\prime} = (\omega)^{\prime} \cup (\omega)^{$$

[٤] إذا كان
$$\sigma(\omega) = \frac{|\omega + \gamma|}{\omega}$$
 ، جد $\sigma(\omega)$

التفاضلل الأستاذ: حسن الطريفي

مشتقة أكبر عدد صحيح:



مثال:

إذا كان
$$\upsilon(m) = \left[\frac{m}{\gamma} + \tau\right]$$
 ، جد ما يلي:

$$= (1-)^{\prime} \upsilon (-) = (1)^{\prime} \upsilon (-)$$

$$=\left(\frac{1}{Y}\right)^{2} \upsilon (\triangle)$$

مثال:

إذا كان
$$v(m) = [m-m]$$
 ، جد ما يلي:

$$= \left(\Upsilon \right)^{r} \upsilon \left(\psi \right)$$

$$= \left(\frac{1}{r} \right)^{r} \upsilon \left(\dagger \right)$$

$$=\left(\frac{1}{r}\right)^{r}\upsilon\left(s\right)$$

$$=\left(1\right)^{r}\upsilon\left(s\right)$$


تدریب:

إذا كان
$$\upsilon(\omega) = \left[\frac{\gamma}{\eta} + \omega + \frac{\gamma}{\eta}\right]$$
 ، جد ما يلي:

$$=\left(\frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}}{\mathbf{v}}\right)^{2}\upsilon\left(\mathbf{t}\right)$$

$$=\left(\mathbf{v}\right)^{2}\upsilon\left(\mathbf{t}\right)$$

مشتقة أكبر عدد صحيح مع اقتران أخر



مثال:

$$\left[\frac{1+\frac{w}{Y}}{1+w}\right]$$
 ، جد ما يلي:
$$\frac{1+\frac{w}{Y}}{1+v} = (v)$$
 (۱) (v) (۱) (v) (۱) (v) (۱) (v) (۱) (v) (۱) (v)

الحل:

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

$$(w)$$
 و (w) $=$ $[\gamma_{\epsilon}, \gamma]$ $=$ $[\gamma_{\epsilon}, \gamma_{\epsilon}]$ $=$ $[\gamma_{\epsilon}, \gamma_{\epsilon}]$

مثال:

 $^{\mathsf{Y}} w + [\mathsf{o} + \mathsf{w}] - [\mathsf{w} + \mathsf{o}] + \mathsf{w}^{\mathsf{Y}}$ جد $^{\mathsf{Y}} (\mathsf{Y})$

 $\upsilon\left(\omega\right) = \left|\omega\right| \left[\frac{\omega}{\gamma}\right] + \omega^{\gamma}$ $= \left(\omega\right) \left(\omega\right)$

 $(1) \quad \frac{|\gamma + \omega|}{\left[\xi - \omega \frac{1}{\gamma}\right]} = (\omega) \quad \frac{|\omega + \gamma| - [\gamma + \omega] - [\gamma + \omega]}{\left[\xi - \omega \frac{1}{\gamma}\right]} = (\omega) \quad \omega$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

- $(w) = w^{\gamma}$ ، ه $(w) = [\gamma w]$ ،
 - جد ما يلي:
 - (۱) ن (۲) (۱) ه (۲)
- $(\cdot)^{(\omega)}(\omega \times \omega)(\omega)$ (1) $(\omega \times \omega)^{(\omega)}(\omega)$

المشتقات العليا:

مثال:

$$1 ^{"}$$
 س $\xi+$ $^{"}$ س $=$ $($ س $)$ بإذا كان υ (س $)$

مثال:

إذا كان
$$\mathcal{O}(m) = m^{2} + m^{2} + 0$$
 وكان

$$\upsilon$$
 (۲) جد قیمه ۱. $\lambda = (\Upsilon)^{(\Upsilon)}$

مثال:

إذا كان
$$v(m) = m^{\alpha}$$
وكان

$$\sigma^{(r)}(\omega)=$$
۲ کس $\sigma^{(r)}$ ، جد قیمة ن.

$\upsilon\left(\omega\right)=\overline{\omega}^{\prime\prime}$ ، $\upsilon^{\prime\prime}\left(\omega\right)=\overline{\omega}^{\prime\prime}$ جد قیمه ۱.

إذا كان v(m) كثير حدود وكان

$$u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} = {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}}$$

$$= {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} = {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}}$$

$$= {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} = {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}} - {}^{\mathsf{T}} u^{\mathsf{T}}$$

التفاضــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

إذا كان
$$\upsilon(m)$$
 كثير حدود وكان $\upsilon(m) + \upsilon^*(m) = \gamma m^* - \gamma m$ ،جد $\upsilon^*(1)$.

إذا كان
$$\upsilon$$
 (س) كثير حدود من الدرجة الثانية، وكان υ (۰) = ۳ ، υ (۱) = ٤ ، υ (۳) جد قاعدة الاقتران.

الحرس الثالث: مشتقات الاقترانات المثلثية

| ں ؑ (س) | <i>ن</i> (س) | ں ؑ (س | (w)v |
|---------------------|--------------|-------------------|------|
| قاس ظاس | قاس | جتاس | جاس |
| قتاس ظاس | قتا <i>س</i> | ـجاس | جتاس |
| _قتا ^۲ س | ظیاس | قا ^۲ س | ظاس |

$$(\pi)$$
 υ ، (ω) $=$ $\frac{\tau}{\omega}$ $=$ (ω) υ

$$(\pi)$$
 υ (ω) υ (π) υ (π) υ (π) (π)

$$\left(\frac{\pi}{\epsilon}\right)^*$$
ں (س) =قاس+ظاس، جد σ

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

| ن ´ (س) | (w)v |
|---|---------|
| جتا () × مشتقة الزاوية | جا () |
| – جا ()×مشتقة الزاوية | جتا () |
| قا ^۲ () × مشتقة الزاوية | ظا () |
| قتا ۲ () × مشتقة الزاوية | ظتا () |
| قا () ظا ()× مشتقة الزاوية | قا () |
| – قتا () ظتا () × مشتقة الزاوية | قتا () |

مثال:

جد ن (س) لكل مما يلي:

$$\left(\frac{1+\sqrt{m}}{m+\sqrt{m}}\right)$$

$$\left(\frac{V+V}{\omega}\right) + \sqrt{1+c\omega}$$

$$\left(\frac{V}{m^{\gamma}+1}\right)$$

قا٧س

ا لدها صــــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$\left(\frac{1+\frac{r}{m}}{r+\frac{r}{m}}\right)$$
ظنتا

$$(v) \quad \mathcal{U}(w) = +\pi \int_{\mathbb{R}^{n}} (w + \pi) \, du$$

$$(\Lambda)$$
 $\upsilon(m) = dd($ جاس + س (Λ)

$$(9) \upsilon(m) = dd(\pi l m)$$

$$(u) = (\pi + \pi \pi)^{\circ}$$
 (۱۱) $(u) = (\pi + \pi \pi)^{\circ}$

$$\frac{q}{r}$$
 (س) = (جاس+جتاس) (۱۲)

$$\sqrt{(m)} = \sqrt{(m)}$$
 (۱۳) تاس (۱۳)

$$\overline{(w)} = \sqrt{w^7 + w^7 + \overline{g}}$$
 (۱٤) (v)

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$\upsilon$$
 (س) = جاس $\frac{1}{7}$ س ، س \in [π ۲۰ ، π 7]، جد قیم س التي تجعل υ (س) = صفر.

إذا كان
$$\upsilon(\omega) =$$
قتا $\omega + d$ تا أن أثبت أن
$$\frac{1}{1-\omega} = \frac{1}{1-\omega}$$

$$(\psi)$$
 (ψ) =قاس

رأ)
$$\upsilon(m) = m+$$
حتاس

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

إذا كان
$$\omega = ظا^3 \omega$$
، جد على أ

اذا کان
$$\omega = \left(\text{قاس} + \text{ظاس} \right)^{\intercal}$$
 جد عس اذا کان

$$\frac{\pi}{\sqrt{\chi}} = \omega$$
 عند $\omega = \frac{\omega s}{2}$ ، جد $\omega = \omega$

آذا کان
$$=$$
جتا $(س ' - 1)$ ، جد ، جد .

$$\left(\left(\omega^{+} + \omega\right)\right)^{\uparrow}$$
 ص =جا

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

إذا كان ص = جائس ، أثبت أن
1
 م 2 + 2 ا جا 1 س

إذا علمت أن
$$\omega = \left(\text{قاس} + \text{ظاس} \right)^{\alpha}$$
 ، أثبت أن
$$\omega = \omega = 0$$

إذا كان
$$\omega = \text{ظا} \omega + \frac{1}{m} \text{ظا}^n \omega$$
 ، أثبت أن $\omega = \text{قا}^3 \omega$.

الأستاذ: حسن الطريفي

الحرس الرابع: قاعدة لوبيتال ومشتقة الاقتران الاسى واللوغاريتمي

$$\dot{\upsilon} = \frac{(\omega)}{(\omega)} \frac{\dot{\upsilon}}{(\omega)}$$
 فأن $\dot{\upsilon} = \frac{(\omega)'}{(\omega)} \frac{\dot{\upsilon}}{(\omega)}$ فأن $\dot{\upsilon} = \frac{(\omega)'}{(\omega)}$ ه $\dot{\upsilon} = \frac{(\omega)'}{(\omega)}$

(۱) جد نہا باستخدام لوبیتال.
$$(x)$$
 جد نہا باستخدام لوبیتال. (x) باستخدام لوبیتال.

(۱) جد
$$_{m}$$
 جاستخدام لوبیتال.

$$\frac{\xi - \frac{\gamma}{m}}{\gamma - m} \underbrace{\downarrow}_{\gamma \leftarrow m} (\xi)$$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

$$\frac{\omega}{\frac{\pi}{\xi} - \omega} = \frac{\pi}{\xi}$$

اثبت باستخدام لوبيتال أن:

$$\frac{\omega \sigma(1) - \sigma(\omega)}{\varphi} = \frac{1}{1 - \omega} \frac{1}{1 - \omega}$$

علماً أن
$$\upsilon'(1) = \Upsilon$$
، $\upsilon(1) = \Upsilon$

باستخدام لوبيتال.

الأستاذ: حسن الطريفي

مشتقة الاقتران الاسي

$$(\omega)'$$
 فأن: ص $=$ ه $\omega^{(\omega)}$ فأن: ص ω

مثال:

جد مشتقة كل مما يلي:

$$^{"}$$
 عظاسه $^{=}$ + ه $^{=}$

$$(1)$$
 υ $(m) = m^{\alpha}$ ه $m + +$

$$(\xi) \ \mathcal{U}(\omega) = (\alpha^{\neg w} - \alpha^{\neg w})^{\gamma}$$

$$(4) \ \mathcal{O}(\omega) = (\alpha^{\gamma} \omega)(\xi - \varphi^{\gamma})$$

$$\frac{\omega a^{\gamma w} + a^{\circ w}}{\omega^{\gamma w}} = \frac{\omega a^{\gamma w} + a^{\circ w}}{\omega^{\gamma w}}$$

$$(a) \ \mathcal{U}(\omega) = (a^{\omega})^{\gamma} + a^{\omega^{\gamma}} + (a^{\omega^{\gamma}})^{\gamma}$$

$$(7) \ \omega = \frac{\omega a^{\gamma \omega} + a^{\circ \omega}}{\omega^{\gamma \omega}}$$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مشتقة الاقتران اللوغاريتمي

إذا كان
$$= \frac{1}{m} = \frac{1}{m}$$
 فأن: $= \frac{1}{m}$ إذا كان $= \frac{1}{m}$ إذا كان عال أبيان أبي

$$\frac{(\omega)'}{(\omega)} = '$$
اذا کان $\omega = \bigcup_{\alpha} \frac{(\omega)}{(\omega)}$ فأن: $\omega' = \frac{(\omega)'}{(\omega)}$

مثال:

جد مشتقة كل مما يلي:

$$(Y) \quad U(m) = \underbrace{\vdash_{u}^{m}}_{u} + \underbrace{\vdash_{u}^{m}}_{u} + \underbrace{\vdash_{u}^{m}}_{u} + \underbrace{\vdash_{u}^{m}}_{u}$$

$$(1) \ \mathcal{O}(m) = m + \underset{\alpha}{\vdash_{\mathsf{L}}} \ ^{\mathsf{L}} + \overset{\mathsf{L}}{\vdash_{\mathsf{L}}} \ ^{\mathsf{L}}$$

$$(\mathbf{z})$$
 ص = $\left(\underbrace{\mathbf{L}}_{\mathbf{z}} \mathbf{w} \right)^{\mathsf{T}} + \mathbf{w}^{\mathsf{T}} \mathbf{L}_{\mathbf{z}} \mathbf{w}^{\mathsf{T}} + \mathbf{v}^{\mathsf{T}}$

$$(\mathbf{r}) \ \mathbf{v} \left(\mathbf{w}\right) = \mathbf{L} \left(\mathbf{v}\right) \mathbf{v} + \mathbf{L} \left(\mathbf{r}\right)$$

التفاضل الأستاذ: حسن الطريفي

$${}^{\circ}\left(\frac{1+{}^{\Upsilon}\omega}{-}\right)=\frac{1}{\omega}\left(\frac{\omega}{-}\right)$$

$$(\mathsf{v})\,\upsilon\left(\mathsf{v}\right) = \bigsqcup_{\mathsf{a}} \mathsf{v}^{\mathsf{v}_{\mathsf{a}}\mathsf{v}_{\mathsf{v}}}$$

$$\frac{\wedge (w-v)^{\circ}(w-v)}{\omega} = \underbrace{(w+v)^{\circ}(w-v)}_{p}$$

$$(\bullet) \ \sigma(\bullet) = \frac{\omega}{\mathsf{Le}^{\omega}}$$

$$U(\omega) = \bigcup_{\alpha} U(\Delta)$$

نمایات علی شکل مشتقة

تذكرأن:

$$\underbrace{\sigma'(1)}_{\text{total}} \underbrace{\sigma'(1)}_{\text{total}} \underbrace{\sigma'$$

$$\sigma'(1) = \frac{\sigma(1+\alpha) - \sigma(1)}{\alpha}$$

$$\frac{\left(\mathfrak{f}\right)'\upsilon-\left(\varpi\right)'\upsilon}{\mathfrak{f}-\varpi}\underbrace{\smile}_{\mathfrak{f}\leftarrow\varpi}=\left(\mathfrak{f}\right)''\upsilon$$

$$(\dagger)' \upsilon - (a + \dagger)' \upsilon \bigsqcup_{\leftarrow} = (\dagger)'' \upsilon$$

مثال:

$$\xi + {}^{\sharp} \omega = (\omega)$$
إذا كان $\omega(\omega) = \omega$

$$\frac{\sigma(w) - \sigma(Y)}{\psi_{-Y}}$$
 فأن $\frac{\sigma(w) - \sigma(Y)}{\psi_{-Y}}$

$$\frac{1}{|\omega|} = (\omega)$$
 إذا كان $\sigma(\omega) = \frac{1}{\omega}$

فأن نہے
$$\frac{\upsilon'(\Upsilon) - \upsilon'(\Upsilon + \alpha)}{\alpha}$$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان ٥ '(٢) = ٥، جد كل مما يلي:

$$\frac{(Y) \cup (w) \cup (Y)}{Y - w} \bigcup_{Y \leftarrow w} (Y)$$

$$(Y) : \bigcup_{\omega \to \infty} \frac{\omega(Y + \alpha) - \omega(Y)}{\alpha}$$

$$(7) \xrightarrow{\upsilon - \upsilon} \frac{\upsilon (7 + 7a) - \upsilon (7)}{3a}$$

$$(\xi) \xrightarrow{\upsilon \to \iota} \frac{\upsilon (1+\alpha) - \upsilon (1)}{\upsilon (1+\alpha) - \upsilon (1)}$$

$$(\circ) \qquad \qquad \frac{-\circ \alpha}{\upsilon (\Upsilon) - \upsilon (\Upsilon + \Upsilon \alpha)}$$

$$(7) \rightarrow \underbrace{\frac{\upsilon(\Upsilon + \Upsilon \alpha) - \upsilon(\Upsilon + \circ \alpha)}{\alpha}}_{\alpha}$$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان $\upsilon'(\tau) = \Lambda$ ، جد ما يلي:

$$\frac{(\omega)\upsilon - (\nabla)\upsilon}{\nabla - \omega} \underset{\nabla \leftarrow \omega}{\longleftarrow} (\Upsilon) \qquad \frac{(\omega)\upsilon - (\nabla)\upsilon}{\nabla - \omega} \underset{\nabla \leftarrow \omega}{\longleftarrow} (1)$$

$$(3) : \frac{\forall x}{x \rightarrow x} \frac{\forall x}{\upsilon (7+7x) - \upsilon (7)}$$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان v'(Y) = Y ، جد ما يلي:

$$\frac{\xi - {}^{\mathsf{Y}} \mathcal{M}}{(\mathsf{Y}) \mathcal{U} - (\mathcal{M}) \mathcal{U}} \underbrace{{}^{\mathsf{Y} \leftarrow \mathcal{M}}}_{\mathsf{Y} \leftarrow \mathcal{M}} (\mathsf{1})$$

$$\frac{\lambda - {^{"}}_{\omega}}{(\omega)} \underbrace{(\gamma)}_{\gamma \leftarrow \omega} (\gamma)$$

مثال:

إذا كان $\upsilon'(\Upsilon) = \Upsilon$ ، $\upsilon'(\Upsilon) = 0$ ، جد ما يلي:

$$\frac{(\Upsilon)' \upsilon - (\omega \Upsilon)' \upsilon}{1 - \omega} \bigcup_{1 \leftarrow \omega} (1)$$

$$\frac{(\Upsilon)' \upsilon - \left(\frac{20-\xi}{\Upsilon}\right)' \upsilon}{2} \underbrace{\bigcup_{\gamma \leftarrow \omega} (\Upsilon)}_{\alpha}$$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

تدریب:

$$(1) \quad \mathcal{O}(\omega) = \mathbb{A}^{\omega} + \bigsqcup_{\alpha} \mathbb{A}^{\omega^{1+1}} \quad \text{i. e. } \quad \mathcal{O}(1).$$

الجواب: ١

(۲) إذا كان
$$\mathcal{O}(\omega) = \omega^{7} - \gamma \omega$$
 فأن $\omega = (1 + \alpha) - \omega(1)$.

الجواب: - ١

الجواب: ۳ه^{-۲} - ٥


ا لدها صــــل الأستاذ: حسن الطريفي

الدرس الخامس: تطبيقات صندسية وفيزيائية

أولاً: تطبيقات مندسية

المماس: هو مستقيم يمس منحنى الاقتران v(m) عند النقطة v(m) والتي تسمى نقطة التهاس.

العامودي على المماس: هو مستقيم يعامد الماس عند نقطة التماس (عند النقطة نفسها $\binom{m}{1}$).



$$\left(,\omega \right) ^{\prime }$$
 ميل الماس (۲) ميل الماس *

$$\frac{1}{\sqrt{m}-\frac{m}{\sqrt{m}}}=\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{m}}=$$

=ظاه

* معادلة المماس:
$$\omega - \omega_1 = \gamma \left(\omega - \omega_1 \right)$$
 حيث $\left(\omega_1 - \omega_1 \right)$ هي نقطة التهاس، (م) هو ميل الماس.

$$\left(\sqrt{m}-m\right)\frac{1-m}{2}=\sqrt{m}-m$$
 * معادلة العامودي على المماس:

مالحظة: الإيجاد معادلة الماس أو العامودي يجب أن يعطى في السؤال واحدة على الأقل مما يلى:

أما m أو ميل المهاس (م)، ونحن نقوم بإيجاد بقية عناصر المعادلة.

أمثلة:

(١) جد معادلة الماس للاقتران

$$\mathfrak{d}(w) = \mathsf{d}w - \mathsf{d}w + \mathsf{d}w$$
 عند $w = \mathsf{d}w$

(٤) جد معادلة الماس والعامودي على الماس للاقتران

$$u = u^{7} - 7$$
 عند $u = 7$.

الأستاذ: حسن الطريفي

(٥) جد معادلة الماس لمنحني

$$\xi = \omega$$
 عند ص $\omega = -1$ مند ص

(٢) جد معادلة الماس للاقتران

(٦) جد معادلة الماس للاقتران

$$\upsilon(\omega) = \frac{1}{\omega}$$
، إذا كان ميله يساوي υ

(٣) جد معادلة الماس للاقتران

$$\xi = \sqrt{m}$$
، عند س $= \xi$

$$\sigma(\omega) = \Upsilon - d \Gamma$$
ن $\sigma(\omega) = - \Upsilon$.

(۷) جد معادلة الماس لمنحنى mod - o = 9 عند (۸) جد معادلة العامودي على الماس للاقتران

النقطة (٢,٤)

التفاضل التفاف الطريفي الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

(٩) جد معادلة الماس للاقتران

$$\sigma(\omega) = \frac{\omega^{\frac{1}{2}}}{\omega} = 1.$$

(١٠) جد معادلة العامودي على الماس للاقتران

$$\upsilon(\omega) = \omega = \omega$$
 , aix $\omega = \omega$.

 $\frac{\pi^{\gamma}}{\xi}$ والذي يصنع زاوية مقدارها $\sigma(w) = w^{\gamma} - w^{\gamma} - w^{\gamma} - w^{\gamma}$ والذي يصنع زاوية مقدارها $\sigma(w) = w^{\gamma} - w^{\gamma} - w^{\gamma} - w^{\gamma}$ مع محور السينات الموجب.

ملاحظات ودلالات ومفاتيح الحل:

(١) التقاطع:

(أ) يقطع محور السينات
$$\rightarrow ص _1 =$$
 صفر.

$$()$$
 يقطع محور الصادات \rightarrow سفر.

$$(--)$$
 اقتران یقطع اقتران $-$ نساویهم ببعض $\sigma(m) = \sigma(m)$.

$$(--)$$
 الماس يوازي محور السينات \rightarrow م = صفر

(c) Iholm يوازي محور الصادات
$$a=a_N$$
 معرف،
$$a_N=a_N$$
 ومعادلة الماس هي $a_N=a_N$

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

(٣) التعامد: -

$$1 -= 1 \times q$$

(ب) الماس يعامل المستقيم ل

$$-$$
 ميل الماس \times ميل المستقيم $-$

$$'\omega = (\omega)'\upsilon$$

(تكون في أسئلة إيجاد الثوابت)

$\sqrt{2}$ جد معادلة الماس لمنحنى υ (س) = $\sqrt{2}$

والذي يوازي المستقيم ص - س = ٥

 $u(m) = \sqrt{m + m + 1}$ عندما يقطع المنحنى محمور الصادات.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

ر عن الله المال الأفقي لمنحنى
$$\overline{v}$$
 (المال \overline{v} (الما

$$\frac{1}{\sqrt{|\varpi|}} = (\varpi)$$
 بحد معادلة الماس لمنحنى $\varpi(\varpi) = \frac{1}{\sqrt{|\varpi|}}$ بحيث يكون عامو دياً على المستقيم $\varpi = \varpi$

(٥) جد معادلة الماس الافقي لمنحنى الاقتران
$$[\pi.^*]$$
 حيث $[\pi.^*]$

التفاضلل التفاضانة الأستاذ: حسن الطريفي

عند نقاط تقاطعه مع المستقيم ص = س.

الاقتران ق(س) = - ٢س٠ + ٥س + ١، جد نقطة

/ نقاط التهاس.

ه س متعامدین عند نقط تقاطعها.

الأستاذ: حسن الطريفي

(۱۱) إذا كان المستقيم ص=جـس + ٥ يمس منحنى

الاقتران ق(س) = أس م + ب س عند النقطة

(-۱، -۳)، جد أ، ب، جـ.

(۱۲) إذا كان المستقيم أ س + ٣ص = ٣ يمس منحنى الاقتران ق(س) = ٤ س + ٢س +
$$\psi$$
 عند النقطة (١، ق(١)) ، جد أ، ψ .

ر۱۳) جد قیمة أ التي تجع المستقیم
$$m = \frac{\omega}{\xi}$$
 مماساً $\frac{\omega}{\xi} = \frac{\omega}{\xi}$ ماساً $\frac{\omega}{\xi} = \frac{\omega}{\xi}$ ماساً $\frac{\omega}{\xi} = \frac{\omega}{\xi}$ اللاقتران ق $(m) = m' + 1$.

$$\omega(\omega) = \frac{\gamma}{\gamma} - \omega \frac{\lambda}{\sqrt{|\omega|}}$$
 جد قیمة جـ.

الأستاذ: حسن الطريفي

جد قيمة أ، أ > ٠

(۲،۲) يمس منحنى الاقتران


ق(س) = - س + ۲ س – ۱ جد قیمة -

(17) ق(m) = m' - 1 س + 1 - 1، یمس محور (18) إذا کان المستقیم المار بالنقطتین (18)السينات، جد قيمة أ.

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

فكرة النقطة الخارجية:

إذا طلب معادلة الماس حيث أن نقطة التماس مجهولة وعُلمت نقطة على الماس (نقطة خارجية) فأن: -



$$\frac{1}{\sqrt{m-m}} = (m)' \upsilon \leftarrow \frac{m - \omega}{m - m} = (m)' \upsilon$$

حيث (س، ، ص،) هي النقطة الخارجية

إذا طلب معادلة العامودي على الماس فأن: -

مثال (۱):

جد معادلة الماس لمنحنى الاقتران $v(m) = \sqrt{m}$ والذي يمر بالنقطة (π, τ) .

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (۲):

جد معادلة العامودي على الماس لمنحنى

$$\sigma(m) = \frac{1}{m}$$
 والذي يمر بالنقطة (۰,۰)

مثال (۳):

جد معادلة الماس لمنحنى الاقتران

 $\sigma(m) = m^{-n} - 1$ س والذي يمر بالنقطة (۱۶-۱۹).

مثال (٤):

جد معادلة الماس لمنحنى الاقتران $v(w) = \frac{1}{w-Y}$ إذا كان العامودي على الماس يمر بالنقطة (Y,Y).

الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

فكرة مساحة المثلث: -

لحساب مساحة المثلث في أي سؤال يجب الحصوص على احداثيات رؤوس المثلث الثلاث.

وذلك عن طريق حل ٣ معادلات ببعضها يتم ذكرها بالسؤال.

على الماس لمنحنى الاقتران $v(m) = \sqrt{m}$ عند النقطة (٤, ٤) ومحور السينات.

(١) جد مساحة المثلث المكون من المحورين (٢) جد مساحة المثلث المكون من الماس والعامودي الاحداثين والماس لمنحنى الاقتران ق(س)= ٦ س – ٣ س^٠ عند س=٢.

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

(٣) جد مساحة المثلث المكون من المهاس المرسوم من النقطة (١,٠) لمنحنى ق(m) = m + m والعامودي على المهاس عند نقطة التهاس والمستقيم m = -1.

(٤) جد مساحة المثلث المكون من الماس لمنحنى ق $(m) = m^{\gamma}$ عند $m = \Upsilon$ ومحور السينات والمستقيم $m = \Upsilon$.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

(٥) جد مساحة المثلث المكون من الماس لمنحنى الاقتران $v(m) = \frac{1}{m}$ والعامودي على الماس عند m=1 ومحور الصادات.

(٦) احسب مساحة المثلث المكون من مماس المنحنى $\frac{1}{m} = \frac{1}{m}$ عند النقطة $\left(\frac{1}{l}, \frac{1}{l}, \frac{1}{l}\right)$ ومحوري السينات والصادات.

ا لدها صــــل الأستاذ: حسن الطريفي

ثانياً: تطبيقات فيزيائية: -

ن(ن) ن(ن) ع(ن) ع(ن) ت(ن

تعریف:

السرعة اللحظية (ع) عند الزمن ن هي
$$\frac{3}{0}$$
(ن) = $\frac{0}{0}$ = ف التسارع اللحظي (ت) عند الزمن ن هو $\frac{0}{0}$ = ف التسارع اللحظي (ت) عند الزمن ن هو $\frac{0}{0}$

دلالات وكلمات مفتاحية: -

المسافة المقطوعة =
$$\mathbf{Y} \times \mathbf{I}$$
 اقصى ارتفاع – ف (ن)

(٦) طول البرج = اقصى ارتفاع عن سطح الأرض
$$-$$
 اقصى ارتفاع عن البرج.

مثال (۱):

-: یتحرك جسم حسب العلاقة ف(ن) = ن 7 - ۹ ن 7 + ۷، جد

(١) السرعة المتوسطة خلال الفترة [٣,١] (٢) تسارع الجسم عندما يعكس من اتجاه حركته.

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال (۲):

قذف جسم رأسياً إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض، بحيث بعده عن سطح الأرض يعطى بالعلاقة

ف(ن) = ۲۰ – ۵ ن۲، جد ما یلی: –

(١) اقصى ارتفاع يصله الجسم.

(٢) سرعة الجسم وهو على ارتفاع ١٥م من سطح الأرض.

(٣) المسافة التي قطعها الجسم خلال الثواني الأربعة الأولى.

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي


059-488-5006

مثال (۳):

قذف جسم رأسياً إلى أعلى من قمة برج بحيث أن ارتفاعه عن البرج يعطى بالعلاقة ف(ن) = ٣٠٠ – ٥ $^{\prime}$ ، جد ما يلي: –



- (٢) سرعة ارتطام الجسم بسطح الأرض.
- (٣) المسافة الكلية خلال الثواني السبعة الأولى.



التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

(٤):

قذف جسم رأسياً لأعلى حسب العلاقة ف(ن) = ١٤٠ - ٥ ن ، جد سرعة الجسم عندما تكون المسافة الكلية المقطوعة تساوي ١٠٠٠م.

مثال (٥):

قذف جسم رأسياً لأعلى حسب العلاقة ف(ن) = ٣٠٠ – ٥ ن، جد ما يلى: –

(١) اقصى ارتفاع يصله الجسم. (٢) سرعة الجسم وهو نازل عندما يكون على ارتفاع ٤٠م.

تدریب:

(۲) قذف جسم رأسياً من لأعلى من نقطة على سطح الأرض وكان يعطى بالعلاقة ف(ن) = أن -0ن، وكان اقصى ارتفاع وصل إليه الجسم هو (۸۰م)، جد ما يلي: -

تماريـــن

ایات: $\frac{2\sigma}{2m}$ عندما m=1 لکل نمایات: (۱)

(۲) إذا كان
$$\sigma(m) = \frac{L_{e_{a}}(\gamma(m))}{\gamma_{m}}$$
, وكان $\gamma(1) = a^{\gamma}$, $\bar{\gamma}(1) = \gamma_{a}$, فجد $\bar{U}(1)$.

(٣) جد مشتقة كل من الاقترانات الآتية:

$$(\dagger) \ \upsilon (\omega) = a^{\omega^{\gamma} + \omega} \qquad (\varphi) \ \exists (\omega) = \bigsqcup_{\alpha} (\omega^{\gamma} - \gamma \omega^{\gamma}), \ \omega \succ \gamma.$$

| ر _۲)ڑ | (۲) (۲) | (۲)۲ | إذا كان $\mathfrak{G}(m) = m^{7} \wedge (m^{7} + 1)$ اعتمد على الجدول المجاور (٤) |
|-------------------|---------|------|---|
| ١ | 1- | ٥ | في إيجاد تُ (١). |

(٥) إذا كان
$$\omega = \upsilon^{\mathsf{T}}(\omega) - \upsilon(\omega^{\mathsf{T}})$$
، جد $\frac{2\omega}{2\omega}$ عندما $\omega = \mathsf{T}$ عندما عندما

(۷) إذا كان
$$v(w) = w + \frac{1}{w}$$
، $w \neq v$ ، ه $(w) = \pi z$ أثبت أن: $(v \circ a)^{-1}(w) = \pi z^{-1}$ سقا $v(w) = \pi z^{-1}$

الدرس السادس: قاعدة السلسلة

تذكر أن:

$$(\upsilon \circ a)\upsilon = (\upsilon \circ a)$$

$$((\omega)\upsilon)=(\omega)(\omega)$$

$$(w)(w)$$
وأن (v) ه (w) وأن (v)

مثال:

إذا كانت $\upsilon(m) = \sqrt{m+1}$ ، ه(m) = +اس ، جد ما يلي:

$$=(\omega)(\omega)$$

$$=(\omega)(\omega)(\omega)$$

$$= (\omega)'(\omega \circ a) (\Upsilon)$$

$$=(\omega)'(\omega \omega)$$

قاعدة

$$(\omega)' \otimes \times ((\omega))' = (\omega)' \otimes (\omega) (1)$$

$$(\omega)' \upsilon \times ((\omega)\upsilon)' = (\omega)'(\upsilon \circ a) (Y)$$

$$\left(\dagger\right)' \mathbf{A} \times \left(\left(\dagger\right)\mathbf{A}\right)' \mathbf{U} = \left(\dagger\right)' \left(\mathbf{A} \circ \mathbf{U}\right) \quad (\Upsilon)$$

$$\left(\mathfrak{f}\right)' \cup \times \left(\left(\mathfrak{f}\right) \cup\right)' = \left(\mathfrak{f}\right)' \left(\cup \circ \mathfrak{a}\right) \tag{\$}$$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان $\upsilon(m) = m^{7} + m$ ، ه $(m) = m^{7}$ ، جد ما يلي:

$$(\omega)'(\omega \circ \omega)$$

$$(\omega)'(\upsilon \circ \upsilon)(r)$$

التفاضيل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال:

إذا كان
$$\upsilon(m)=\sqrt{m+1}$$
 ، ه $(m)=1$ ، ه $(m)=1$ وكان $(m\circ \upsilon)'(m)=1$ ، جد قيمة الثابت ١٠

مثال:

$$(w)'(w) = \frac{1}{w'+1}$$
، ه $(w) = d$ اس ، أثبت أن $(v \circ a)'(w) = 1$.

إذا كان
$$\upsilon(w) = w^{7} + 7w$$
، ه $(w) = w^{7} + e^{7}$ جد $(\upsilon' \circ a)'(1)$.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان
$$\upsilon(w) = w^{7} - Y$$
، فها قيمة $(\upsilon'\circ\upsilon)'(1)$:

مثال:

إذا كان
$$\upsilon\left(\omega\right)=\omega^{\gamma}\left|\omega^{\circ}\right|$$
 ، وكان ه $\left(\gamma\right)=3$ ، ه $\left(\gamma\right)=-1$ ، جد $\left(\upsilon\circ\alpha\right)^{\gamma}\left(\gamma\right)$.

إذا كان
$$\upsilon(w) = w^{"}$$
، ه $(Y) = Y^{"}$ ، ه $(Y) = -Y^{"}$ ، ه $(Y) = 0$ ، جد $(\upsilon \circ a)$ ((Y)).

التفاضيل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

قاعدة:

$$(\omega)'$$
 اِذَا کان $\omega = (\upsilon(\omega))^{\vee}$ فأن $\omega' = \omega(\upsilon(\omega))^{\vee} \times \upsilon'(\omega)$.

مثال:

إذا كان
$$\sigma(m) = \left(\frac{m+1}{m-1}\right)^{\circ}$$
، جد $\sigma'(1)$.

مثال:

$$\upsilon\left(\omega\right)=\left(\omega^{7}+2\omega\right)^{7}$$
، جد $\upsilon'\left(\omega\right)$.

$$\upsilon(\omega) = (\pi)'$$
 ع جد υ (س) جدا υ

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

$$\upsilon\left(\frac{\pi}{\xi}\right)'$$
 ع جد $\upsilon^{\lambda}\left(\upsilon^{\lambda} + \varepsilon \upsilon^{\lambda}\right) = (\upsilon)$

مثال:

$$\upsilon(\omega) = \frac{\omega}{(\omega^{\gamma} + 1)^{\gamma}}$$
، جد $\upsilon'(1)$.

$$\omega = \left(\underbrace{\mathsf{Le}}_{\mathbf{a}} w^{\mathsf{m}} \right)^{\mathsf{m}} + \underbrace{\mathsf{Le}}_{\mathbf{a}} w^{\mathsf{m}} + \mathbf{a}^{\mathsf{m}} \cdot \mathbf{a}^{\mathsf{m}} \cdot$$

قاعدة السلسلة:

$$\frac{23}{16}$$
 إذا كان $\omega = \upsilon(3)$ ، $3 = a(m)$ فأن $\frac{20}{2m} = \frac{20}{23} \times \frac{23}{2m}$

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

للوصول للمتغير س لابد من المرور بالمتغير ع فسميت بقاعدة السلسلة لان الوصول للمتغير المطلوب يكون بالتسلسل وليس بشكل مباشر.

مثال:

$$- \frac{1}{1+\omega} = \frac{3}{1-0}$$
 عندما $\omega = \frac{3}{1-0}$ جد عندما $\omega = 0$

إذا كان
$$\omega = 43^{\circ} + 7$$
، $3 = \omega^{7} + 3$ جد $\frac{2\omega}{2}$.

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

إذا كان
$$3 = \omega^{1} + \omega + 1$$
، $\omega = \frac{7}{m}$ ، جد $\frac{23}{2m}$.

مثال:

$$\omega = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} =$$

$$O_{N-1} = \frac{2\omega}{N} + 2\omega, \quad A = \frac{2\omega}{N} =$$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

$$\frac{\pi}{\xi} = \omega$$
 عند $\frac{\delta}{\delta}$ عند $\frac{\delta}{\delta}$ عند $\frac{\delta}{\delta}$ عند $\frac{\delta}{\delta}$ عند δ

مثال:

$$\gamma = \omega$$
 عند $\omega = 1$ عند $\omega = 1$ عند $\omega = 1$ عند $\omega = 1$

تذكير

$$((\omega)) = \mathcal{U}$$

$$(\omega)'$$
 فأن $\omega'=\upsilon$ (ه (ω) فأن

$$^{\circ}\left(\left(\omega\right) \upsilon\right) =0$$

$$(\omega)'$$
 $\upsilon \times ^{-\nu} ((\omega) \upsilon) v = '$ فأن ص

توضيح

$$\omega \Upsilon \times (\Upsilon \omega)' \upsilon \leftarrow (\Upsilon \omega) \upsilon$$

$$(\omega)' \upsilon \times (\omega) \upsilon \leftarrow (\omega)' \upsilon$$

$$^{7}\omega^{7}\times(^{7}\omega)'$$
 $\upsilon\times(^{7}\omega)^{7}$ υ \$ $\leftarrow(^{7}\omega)^{5}$ υ

مثال:

اذا کان
$$\omega = \omega^{\gamma}$$
 عندما $\omega = (1 + 1)^{\gamma}$ وکان $\omega^{\gamma}(1 + 1) = 1$ ، جد $\frac{2\omega}{2\omega}$ عندما $\omega = 1$.

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال:

$$\upsilon(\Upsilon)$$
 = س * + عس + ۱، جد $\upsilon(\Upsilon)$.

مثال:

$$(10)'$$
 اذا کان $(00) = m^{7} + 1$ ، جد $(10)'$

$$\upsilon(\Upsilon)'$$
 ع جد τ + τ مجد τ + τ τ = (۱+ ω τ).

مثال:

$$\frac{\pi}{\eta}=\omega$$
 عند $\frac{\sigma s}{\sigma s}$ ، جد $\frac{\sigma v}{\sigma s}$ عند $\frac{\pi v}{\tau}$

مثال:

$$\left(\frac{1}{Y}\right)'$$
 بجد $\left[\frac{\pi}{Y}, \cdot \left[\frac{\pi}{Y}\right]\right]$ ، جد $\left[\frac{\pi}{Y}, \cdot \left[\frac{\pi}{Y}\right]\right]$ ، جد $\left[\frac{\pi}{Y}, \cdot \left[\frac{\pi}{Y}\right]\right]$

التفاضلل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال:

$$(1-)''(\omega)=\omega^{7}+7$$
اذا کان $\omega(\omega)=\omega^{7}+7$ ، ه $(\omega)=\omega^{7}$ ، فأن $(\omega'\circ a)^{7}(-1)$.

إذا كان
$$\upsilon(w) = \bigsqcup_{\alpha} (w+\alpha)^{\alpha}$$
، ه $(w) = \alpha^{\gamma | \omega}$ ، (ه $(\omega) = \gamma^{\gamma | \omega}$) ا، جد قيمة الثابت ١٠

تماريــن

(۱) جد النقطة / النقط على منحنى $v(m) = m^{-1} - m + 1$ التي يكون عندها الماس للمنحنى عمودياً على المنتقيم v(m) = m + 1 المنتقيم v(m) = m + 1 المنتقيم v(m) = m + 1

$$\frac{\pi}{\xi} = -$$
ظا 7 س عندما س $= -$ ظ 7 ل عندما س $= \frac{\pi}{\xi}$.

(٣) إذا كان المهاس لمنحنى $\upsilon(m) = \underbrace{\vdash}_{\alpha} \frac{w}{\gamma}$ ، عندما $w = \gamma$ يقطع محوري السينات والصادات في النقطتين ب، جـ على الترتيب، جد مساحة المثلث م ب جـ، حيث م نقطة الأصل.

(٤) إذا كان المستقيم
$$m = 1 - 7$$
 يمس منحنى الاقتران $v(m) = \frac{7m}{m-7}$ ، $m \neq 7$ ، جد قيم أ.

(٥) قذف جسم رأسياً إلى أعلى وفق العلاقة $\dot{m v} = \mathbf v \cdot \mathbf v \cdot \mathbf v \cdot \mathbf v$ ، حيث ف ارتفاعه بالأمتار، ن بالثواني. جد سرعة الجسم عندما تكون المسافة الكلية المقطوعة ١٠٠ م.

(٦) من نقطة على سطح الأرض قذف جسم رأسياً إلى أعلى، وكان ارتفاعه ف بالأمتار بعد ن من الثواني يعطي بالعلاقة ف $= \sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$ ، جد:

(أ) أقصي ارتفاع يصله الجسم.

(ب) سرعة الجسم وهو نازل عندما يكون على ارتفاع ٤٠ م.

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

الحرس السابع: الاشتقاق الضمني

تذكرأن:

| مشتقته | الاقتران | مشتقته | الاقتران |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| — ه × ص | ص ه . | ص – | ص |
| <u>- ص</u> ۲ <u>اص</u> | ر ص | ۲ ص ص | ص ۲ |
| س×٢ص ⁻ + ص ٢ | س ص | ۳ص ۲ ص | ص ٣ |
| <u>- ص</u> ص | لـوص ه | رس × ^{۱–۷} س | ص ٧ |

مثال (۱):

$$\frac{2\omega}{|\zeta|}$$
 ان س $\frac{2\omega}{1+\omega}$ + ص $\frac{2\omega}{1+\omega}$ ، جد $\frac{2\omega}{2\omega}$ ، جد $\frac{2\omega}{2\omega}$ ، جد ازدا کان س

مثال (۲):

$$-\frac{200}{2}$$
 ، جد $=\frac{200}{2}$ ، جد $=\frac{200}{2}$.

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (۳):

۳ سجاسجتا۲ س ، جد عص .

مثال (٤):

 $\sqrt{2m} + \overline{m} = m^{2} + 2m - 0$ ، جل $\frac{2m}{2m}$.

مثال (٥):

 $\frac{200}{6}$. $\frac{200}{6}$. $\frac{200}{6}$. $\frac{200}{6}$.

ا لتفا ضــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (٦):

مثال (۷):

$$m^{7}+m^{7}=7$$
س ، جد ص $m^{2}=4$ عند (۳,۳).

مثال (۸):

$$\frac{\xi}{m} + \frac{\gamma}{m} = \frac{\gamma}{m}$$
 عند (۲, ۲).

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (۹):

جد ع^{٢ص} لكل مما يلي:

مثال (۱۰):

اذا کان $0 = 3^{"} + 1$ ، س $2 = 3^{"} - 1$ ، جد $\frac{20}{20}$ عندما 3 = 7، س \rightarrow •••

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

مثال (۱۱):

إذا كان
$$\omega = \frac{(m+1)^{\circ}(1+m)^{2}}{(m^{7}+1)^{7}}$$
، جد $\frac{2\omega}{2m}$.

مثال (۱۲):

-3=0 عندما -3=0 عندما -3=0 اذا کان -3=0 عندما -3=0

ا لتفا ضــــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

مثال (۱۳):

إذا كان
$$\upsilon'(\Upsilon) = \Upsilon$$
، وكان $\upsilon'' = \upsilon(\Upsilon)$ جد $\frac{2\upsilon}{2\varpi}$ عند (Υ, Υ) .

مثال (۱٤):

$$\mathbf{a}^{v'+Y^{out}} + \mathbf{oua}^{v'} = \mathbf{a}^{v'} + \left(\mathbf{v}^{v'} + \mathbf{v}^{v'}\right)^{1}, \frac{\mathbf{z} \mathbf{ou}}{\mathbf{z} \mathbf{ou}} \Big|_{(\cdot,\cdot)}.$$

مثال (۱۵):

$$T = \omega$$
 عند $\omega = 0$ ، جد $\frac{2\omega}{2}$ عند $\omega = 0$.

تطبيقات مندسية:

(۱) جد معادلة الماس لمنحنى العلاقة $(m+\omega)^{*}-m\omega^{*}=0$ ، $\omega > 0$ ، عند نقطة تقاطع منحناها مع $-\infty$ المستقيم $-\infty$

$$\Upsilon + m = - \Upsilon + m + \Upsilon$$

(۲) جد النقط على منحنى العلاقة $\sqrt{m} + \sqrt{m} = 7$ ، التي يكون عندها الماس موازياً للمستقيم m + 7m = 0

m > 1 عند نقطة تقاطع المنحنى مع المستقيم $m^2 + m^2 = m^2$ ، عند نقطة تقاطع المنحنى مع المستقيم m > 1

$$(\Upsilon - \omega) = \frac{\Upsilon - \sigma}{\sigma} = 0$$
 الجواب: $\omega - \sigma = \frac{\Upsilon}{\sigma}$

(٤) جد معادلة المهاس والعامودي على المهاس لمنحنى العلاقة $V^{m} - V^{m} - V^{m} - V^{m} = 0$ عند النقطة (٤).

$$(\xi - \omega) = \frac{\xi \vee -}{0} = 1 - \omega$$
 المحاس: $\omega - 1 = \frac{\xi \vee -}{0}$

$$(\xi - \omega) = 1 - \omega$$
العامودي: $\omega - 1 = \frac{\delta}{2} (\omega - \xi)$

(٥) جد معادلة الماس لمنحنى العلاقة $ص^{7} + (m - m) + 9 = 9$ عند النقطة (m, 3 - 1) التي تقع على منحنى العلاقة.

$$(1-w)^{\frac{7}{V}}=1+w$$
الجواب: $w+1=\frac{7}{V}$

التفاضل التفاضات الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

(٦) جد معادلة الماس لمنحنى
$$0^{7} - 7$$
 ا $0 = 0$ ، إذا كانت معادلة العامودى $70 + 0 = 0$.

$$^{\prime}$$
 بين أن الماس لمنحنى العلاقة $^{\prime}$ = لوس $^{\prime}$ ص، عندما $^{\prime}$ = 1 يكون أفقياً، س، $^{\prime}$ $^{\prime}$. .

تطبيقات فيزيائية:

(۱) يتحرك جسم حسب العلاقة
$$3^{7}=$$
 \bullet ، احسب تسارع الجسم عندما تكون السرعة Λ م/ ث. الجواب: $\tau=3$ م/ ث.

(٢) يتحرك جسم حسب العلاقة $3^7 = 7 - \frac{1}{6}$ ، إذا علمت أن تسارع الجسم يساوي ٩ م/ ث في اللحظة التي تنعدم فيها السرعة، جد قيمة أ.

(٣) يتحرك جسم حسب العلاقة
$$3^{7} = 1 - 1$$
 ف $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$ بيتحرك جسم حسب العلاقة $3^{7} = 1 - 1$

(٤) إذا كان $3 = 1\sqrt{2}$ ميث أ، 2 > 1 ، يمثل حركة جسم على خط مستقيم، إذا كان تسارع الجسم 1 < 1 مراث مراث على جد قيمة الثابت أ.

الاثبــــات

(١) إذا كان ص = جاس، أثبت أن ص البص = صفر

(٢) إذا كان س =جاص، أثبت أن ص ً =ظاص قا ٢ص.

(٣) إذا كان سص = جاس، أثبت أن سص ٤ ٢ ص ٢ + سص =٠.

(٤) إذا كان س =ظتا٢ص، أثبت أن ص = -ص جا٤ص.

التفاضــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$-\frac{\gamma_0}{1} = -\frac{\gamma_0}{1} = -\frac{\gamma_0}{1} = -\frac{\gamma_0}{1} = -\frac{\gamma_0}{1}$$
.

$$\xi = {}^{1} - {}^{1} + {}^{2} - {}^{2} + {}^{3} - {}^{4} + {}^{2} - {}^{4} + {}^{2} - {}^{4} - {}^{4} + {}^{2} - {}^{4$$

(۷) إذا كان
$$m^{1} + m^{2} = 1$$
، أثبت أن $m^{2} + m^{2} = 0$

$$(\wedge)$$
 إذا كان ه $^{"}$ \times ه $^{"}$ = \oplus $+$ \wedge ، أثبت أن \oplus $-$ ه $^{"+}$

ا لتفا ضـــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$(11)$$
 إذا كان $0^0 = 4$ محيث 0 محيث 0 0 طاء 0 ، أثبت أن: 0^{-1} 0

$$-\frac{7}{m} = \frac{\sqrt{m}}{m} = \frac{\sqrt{m}}{m}$$
 . أثبت أن: $\frac{m}{m} = \frac{7}{1 - m}$.

$$(17)$$
 إذا كان $(m+\omega)^{\circ} = \omega^{1} \omega^{1}$ ، أثبت أن: $\omega = \frac{\omega}{m}$.

تماريـــن

(۱) جد $\frac{200}{200}$ لکل مما یأتی:

$$(--)$$
 $\omega = + \omega$ (د) $\omega + \omega$

(۲) جد معادلة العمودي على منحنى الدائرة التي معادلتها $m^{'}-m+m+m'=0$ ، عند كل من نقطتي تقاطعها مع منحنى m=m'-m+0.

(٣) يتحرك جسم على خط مستقيم وفق العلاقة ف $^{1} = ^{1}$ 1 2 ، حيث ف المسافة بالأمتار، ن الزمن بالثواني، جد قيمة أ الموجبة. علماً بأن سرعته بعد ٢ ثانية تساوي ١ م/ث.

(٤) إذا كانت ف = أجا(7 + 7)، $1 \neq 0$ هي معادلة الحركة لجسم يتحرك على خط مستقيم، حيث أ، م عددان ثابتان، أثبت أن: = -3 ف عددياً. ف المسافة بالأمتار، ن الزمن بالثواني.

(٥) إذا كان المستقيم المار بالنقطة (٢-، ٠) يمس منحنى العلاقة $\mathfrak{Z}^{m} + \mathfrak{D}^{1} = \mathfrak{Z}^{1}$ جد نقطة / نقط التهاس.

(٦) إذا كان ه $^{\circ}$ + ه $^{\circ}$ = ه $^{-\circ}$ + ه $^{-\circ}$ ، فجد $\frac{2\sigma}{2\sigma}$ عند النقطة (-١،١).

(۷) إذا كانت $m^{\gamma} = L_{e_{\alpha}}(m_{\omega})$ ، mى $\omega \rightarrow 0$ ، فجد $\frac{2\omega}{2m}$ عند النقطة (۱، هـ).

 (\wedge) إذا كان (ω) ، ه (ω) اقترانين قابلين للاشتقاق وكانت (ω) (ω)

$$\cdot \cdot \neq (w)$$
 اثبت أن: $\frac{\overline{w}}{w} = \gamma \left(\frac{\overline{v}}{v} + \frac{\overline{w}}{w}\right)(w)$ ، حیث $v \neq v$ ، $v \in w$ ، $v \in w$

تمارين عامة

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

| إذا كان متوسط تغير الاقتران ق(س) في الفترة [١، ٣] يساوي ٤ وكان متوسط تغير نفس الاقتران | ١ |
|--|---|
| في الفترة [٣،٧] يساوي -٥، فها متوسط تغير الاقتران ق(س) في [١،٧]؟ | |

۱ () ۲ ()

إذا كان المهاس المرسوم لمنحنى ق(س) عند النقطة (٢، -١) يصنع زاوية قياسها ١٣٥° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، فها قيمة $\frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000}$

1 (a) $\frac{1}{7}$ (\Rightarrow $\frac{1}{7}$ (\Rightarrow 1- (\dagger

ا إذا كان ق(س) = جتا٢س، فها قيمة قرص + ٦ق(س) ؟

أ) جتا٢س ب) جا٢س جـ) ٢جتا٢س د) ٢جا٢س

إذا كان ق $(\sqrt{1 + (1 + 1)}) = \sqrt{1 + 1}$ وكان ق قابلاً للاشتقاق، فها قيمة ق(7) ؟

أ) ١٦ (١٦) ٢٩ ح. ١٤٤ (١٤٤)

 $(1^{-}, 1)$ فما قيمة $\frac{c}{c}$ عند النقطة $(1^{-}, 1)$?

اً) ۲- (ب ۲- (أ

(0) و (0) = (0) و (0) = (0) و (0)

أ) ٠ ب عبر موجودة

أ) - ٨ م/ث٬ ب) ٨م/ث٬ جـ) ١٢ م/ ث٬ د) - ١٢م/ ث٬

الأستاذ: حسن الطريفي

(س)
$$= \frac{1}{1 + (m)}$$
 إذا كان قَ $(m) = \frac{1}{1 + (m)}$ هـ(س) وظاس ، فها قيمة (ق ٥ هـ) واب ؟

- د) قا۲س ظ۲س
- أ) قا^٢س ب حتا^٢س جـ) ١

 - $(1)^{\frac{7}{7}}$ ، فيا قىمة قَ(١) و (س $(1)^{\frac{7}{7}}$) فيا قىمة قَ(١)
- د) 🕌
- $\frac{10}{14} \left(\Rightarrow \frac{\xi}{4} \left(\varphi \right) \right) \frac{11}{14} \left(\frac{1}{14} \right)$

 - $\frac{c \, \omega}{\sqrt{2}}$ إذا كانت $\omega = -\pi$ ا منها قيمة $\frac{c \, \omega}{\sqrt{2}}$ عنها قيمة أبد المانت $\frac{c \, \omega}{\sqrt{2}}$ عنها قيمة أبد المانت أبد الما

$$\frac{m}{1} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{-1}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3 - \frac{m^{2}}{\sqrt{1 - m^{2}}}) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1 - m^{2}}} (3$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\omega^{7}}}$$

- (۳) إذا كان (ق ٥ هـ) (٣) = ١٥ ، وكان ق(س) = $w^{7} 9$ ، هـ (٣) = ٥ ، فيا قيمة هـ (٣)?
 - د) ٣
- ر) ۱٫٥ (ب

$$\overline{(m)} = \sqrt{m^{2} + 7m + 1}$$
ج_) ق

$$(1) = -7$$
 ، $(3) = -7$ ، $(3) = -7$ ، $(4) = -7$ ، $(4) = -7$ ، $(5) = -7$ ، $(7) = -7$ ، $(7) = -7$. $(7) = -7$. $(7) = -7$

$$(7) = 7, \quad \vec{v} = (7) = 7, \quad \vec{v} = (7) = 7, \quad \vec{v} = (7)$$

- وبيتال جد قيمة كل من النهايات التالية باستخدام قاعدة لوبيتال

1 - w = a - i

ج نہ<u>ا جا۲س – جاس</u>

التفاضــل الأستاذ: حسن الطريفي

059-488-5006

$$(m) = \begin{cases} m^7 + \bar{b}(m-1) & m \ge 1 \\ 0 & m \le 1 \end{cases}$$
 , وكان متوسط تغير الاقتران $\bar{b}(m)$, $m < 1$

في الفترة [٠، ٢] يساوي ٣ جد متوسط تغير الاقتران هـ (س) في الفترة [٠، ٣]

$$\sqrt{\frac{5}{2}}$$
 إذا كانت $\frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 7$ ، ق متصلاً على ح.

$$\underbrace{-\frac{m^7 \, \overline{\mathfrak{g}}(m) - \overline{\mathfrak{g}}(1)}{m - 1}}_{n \to 1}$$

- يقف أحمد ونزار على سطح بناية، أفلت أحمد كرةً من السكون وَفق العلاقة ف (ن) = ٥٠، وفي اللحظة نفسها، رمى نزار كرةً أخرى عمودياً إلى أسفل وَفق العلاقة ف (ن) = ٥١٠ + ٥٠، فإذا ارتطمت كرة أحمد بالأرض بعد ثانية واحدة من ارتطام كرة نزار، ما سرعة ارتطام كرة نزار بالأرض؟

 (ف الإزاحة بالأمتار، ن الزمن بالثواني)

ابحث في قابلية الاقتران للاشتقاق على مجاله.

- يتحرك جسم على خط مستقيم وَفق العلاقة ف = $\Upsilon(a_1^{7^{\circ}} a_1^{-7^{\circ}})$ ، بيّن أن تسارع الجسم في أي لحظة يساوى ٤ ف عددياً. (ف الإزاحة بالأمتار، ن الزمن بالثواني)
 - $\frac{\pi}{\xi}$ إذا كان ق $(m) = + \pi^m \pi^m$ بجد قَرَّ $\frac{\pi}{\xi}$).

$$(m, \bullet) = (m - Y)^{n} (m + Y m)^{2}, m \in [\bullet, *]$$
 ق (س) = (س – ۲)

$$\left[\frac{\pi}{\mathbf{Y}}, \mathbf{Y}\right] \ni \mathbf{W} \cdot (\mathbf{W}) = \mathbf{Y} + \mathbf{Y} \cdot \mathbf{W} = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{W}$$

التفاضل التفاضات الطريفي الطريفي المستاذ: حسن الطريفي

جد $\frac{c}{c}$ لكل من الاقترانات الآتية:

•
$$\neq$$
 س ه_ مرس $=$ ق (س) $=$ محاس \neq • محاس \neq •

• خیاس
$$= (w) = \frac{w - w}{-2}$$
 ، حیث $w > 0$ ، جتاس $= (w)$

- 0 يتحرك جسم في خط مستقيم حسب العلاقة ف(ن) = أ(جتا٢ن + جا٢ن) حيث ف تمثل بعد الجسم عن النقطة الثابتة (و)، ن الزمن بالثواني. ما تسارع الجسم عندما يكون على بعد ٣ أمتار من النقطة (و)؟
 - $\frac{1}{m}$ جد النقطة/ النقاط التي يكون عندها الماس لمنحنى ق(س) = $m + \frac{1}{m}$ ، $m \neq 0$ موازياً للقاطع الواصل بين النقطتين (۱، ۲) ، (۲ ، $\frac{0}{7}$)
 - √ أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآني:

| جاز | مستوى الان | 3 | مؤشر الاداء | |
|-------------|------------|-------|--|--|
| دون المتوسط | متوسط | مرتفع | مؤسر الاداء | |
| | | | ايجاد متوسط التغير جبريا وهندسيا | |
| | | | استخدام قاعدة لوبيتال في ايجاد المشتقات | |
| | | | ايجاد مشتقات الاقترانات واحل مسائل منوعة عليها | |
| | | | ايجاد مشتقة اقترانات ليست كثيرة حدود | |
| | | | توظيف قاعدة السلسلة والاشتقاق الضمني في ايجاد مشتقة اقترانات | |